

```

1 restart;maple_mode(1);cas_setup(0,0,0,1,0,1e-10,10,[1,50,0,25],0,0,0); #radians,pas de cmplx, pas de Sqrt
Warning: some commands like subs might change arguments order
2 -----Exercice-----
3 P:=x^4+x+1;
x^4 + x + 1
4 A:=1/d*add(a[j]*x^j,i=0..degree(P)-1);
(1/d) · (a[0] + (a[1]) · x + (a[2]) · x^2 + (a[3]) · x^3)
5 H:=d*A;
d · (1/d) · (a[0] + (a[1]) · x + (a[2]) · x^2 + (a[3]) · x^3)
6 M:=matrix([seq([seq(coeff(rem(A*x^i,P,x),x,j),i=0..degree(P)-1),j=0..degree(P)-1)]));
| a[0]  -(a[3])  -(a[2])  -(a[1]) |
| d      d      d      d      |
| a[1]  a[0]-(a[3])  -(a[3])-(a[2])  -(a[2])-(a[1]) |
| d      d      d      d      |
| a[2]  a[1]      a[0]-(a[3])  -(a[3])-(a[2]) |
| d      d      d      d      |
| a[3]  a[2]      a[1]      a[0]-(a[3]) |
| d      d      d      d      |
7 M:=matrix(4,4,(i,j)->coeff(rem(A*x^i(P),x,i-1))); #c'est plus simple
// Warning: x A P declared as global variable(s)
| a[0]  -(a[3])  -(a[2])  -(a[1]) |
| d      d      d      d      |
| a[1]  a[0]-(a[3])  -(a[3])-(a[2])  -(a[2])-(a[1]) |
| d      d      d      d      |
| a[2]  a[1]      a[0]-(a[3])  -(a[3])-(a[2]) |
| d      d      d      d      |
| a[3]  a[2]      a[1]      a[0]-(a[3]) |
| d      d      d      d      |
8 cp:=charpoly(M,x);
Done
9 res:=resultant(subs(x=y,P),d*x-subst(x=y,H),y); #attention re est un mot reserve
Done
10 le poly caract est 1/d^(deg P) * resultant: verification:
11 normal(d^(degree(P))*cp-res); #ils sont bien egaux
0
12 P:=x^4+1;
x^4 + 1
13 A:=x^2:H:=A;
( Done, x^2 )
14 M:=matrix([seq([seq(coeff(rem(A*x^i,P,x),x,j),i=0..degree(P)-1),j=0..degree(P)-1)]));
| 0 0 -1 0 |
| 0 0 0 -1 |
| 1 0 0 0 |
| 0 1 0 0 |
15 cp:=charpoly(M,x);
Done
16 res:=resultant(subs(x=y,P),x-subst(x=y,H),y);
Done
17 le poly caract est 1/d^(deg P) * resultant: verification:
18 expand(cp-res);

```

19 le poly min est une puissance de:

20 `gcd(res,diff(res,x));`

$$x^2 + 1$$

21 `pmin(M,x);#ils sont egaux.`

$$x^2 + 1$$

22 -----Exercice-----


23 `XT:=t*(t^2-1)^2;YT:=t^2+1;`

$$(t \cdot (t^2 - 1)^2, t^2 + 1)$$

24 `eq:=resultant(XT-x,YT-y,t);`


$$x^2 - y^5 + 9 \cdot y^4 + (-32) \cdot y^3 + 56 \cdot y^2 + (-48) \cdot y + 16$$

25 `dessin1:=plotparam(XT+I*YT,t=-2..2);`



26 `dessin2:=implicitplot(eq=0,x=-5..5,y=-5..5,xstep=0.01,ystep=0.01);`

Evaluation time: 0.72



27 -----Exercice-----

28 `C1:=x*y-4;C2:=y^2-(x-3)*(x^2-16);`

$$(x \cdot y - 4, y^2 - (x - 3) \cdot (x^2 - 16))$$

29 `d1:=implicitplot(C1,x=-7..7,y=-8..8,color=red+line_width_2);`


Hyperbola of center (0,0)

Done

30 `d2:=implicitplot(C2,x=-7..7,y=-8..8,color=blue+line_width_2,xstep=0.01,ystep=0.01);`

Evaluation time: 0.65

Done



32 eqx:=resultant(C1,C2,y); #On elimine y

$$-x^5 - (-3) \cdot x^4 - (-16) \cdot x^3 - 48 \cdot x^2 + 16$$

33 Astuce: pour ne pas passer en flottants via le menu deroulant, on lui donne une extension de corps sous forme d'un flottant.

34 factor(eqx,1.1); # on obtient 5 points reels.

$$-1.0 \cdot (x + 0.6633796231) \cdot (x + 0.5365997443) \cdot (x - 2.749235551) \cdot (x - 4.105876927) \cdot (x + 3.981892356)$$

35 c'est de degre 5 car le centre de projection (0,1,0) est solution.

36 resultant(subs(y=2\*x,C1),subs(y=2\*x,C2),x); #il n'est pas nul

$$764$$

37 NB: A=(1,1) n'est pas sur la droite y=2x. Bt=(t,-2t) eq param de la droite (ABt): x=1+(t-1),y=1+(-2t-1)

38 C1t:=subs(x=1+(t-1),y=1+(-2\*t-1),C1);

$$(1 + 1 \cdot (t - 1)) \cdot (1 + 1 \cdot (-2 \cdot t - 1)) - 4$$

39 C2t:=subs(x=1+(t-1),y=1+(-2\*t-1),C2);

$$(1 + 1 \cdot (-2 \cdot t - 1))^2 - (1 + 1 \cdot (t - 1) - 3) \cdot ((1 + 1 \cdot (t - 1))^2 - 16)$$

40 la projection est donn'ee par les points de coordonn'ee (t,-2t) o'u t racine de:

41 p2:=resultant(C1t,C2t,t);

$$-14699 \cdot t^6 - (-25716) \cdot t^5 - (-1779) \cdot t^4 - 15116 \cdot t^3 - 624 \cdot t^2 - (-2496) \cdot t + 448$$

42 car c'est l'intersection de y=2x avec la droite passant par (1,1) et le point a l'infini de Oy qui etait bien dans C1 inter C2

43 sol:=solve(p2\*1.0,t);

Warning! Algebraic extension not implemented yet for poly [14699,-11017,-12796,2320,2944,448]

$$(1, -0.2487685675, -0.3273837129, 1.231806181, 0.6001057333, -0.5062528649)$$


44 pi1:=seq(point(sol[i]-2\*I\*sol[i],color=black+point\_width\_3),i=1..6): #les points sur la droite y=-2x

Done

45 di1:=seq((droite(1+1,pi1[i],color=green)),i=1..6): # les 6 droites:

Done

46 (d1,d2,pi1,d1); #NB un point d'intersection de C1 et C2 est a l'infini.



47 C1:=(x-2)^2+y^2-4;

$$(x-2)^2+y^2-4$$

48 C2:=y^2-(x-3)\*(x^2-16);

$$y^2-(x-3)\cdot(x^2-16)$$


49 d1:=implicitplot(C1,x=-1..5,y=-3..3,color=red):

Done

50 d2:=implicitplot(C2,x=-5..8,y=-8..8,color=blue):

Done

51 (d1,d2);



52 eqx:=resultant(C1,C2,y); #On elimine y

$$x^6+(-4)\cdot x^5+(-36)\cdot x^4+176\cdot x^3+208\cdot x^2+(-1920)\cdot x+2304$$

53 factor(eqx,1.1); # on obtient 5 points reels.

$$(x+-3.999999814)\cdot(x+-4.000000477)\cdot(x^2+-5.211102613\cdot x+6.788897614)\cdot(x^2+9.211102397\cdot x+21.21110185)$$

54 factor(eqx); #On voit qu'il faut introduire le discriminant.

$$(x-4)^2\cdot(x^2+2\cdot x-12)^2$$

55 factor(eqx,sqrt(13));

$$(x-4)^2\cdot(x+-\sqrt{13}+1)^2\cdot(x+\sqrt{13}+1)^2$$

56 eqred:=gcd(eqx,diff(eqx,x));


$$x^3+(-2)\cdot x^2+(-20)\cdot x+48$$

57 rac:=[solve(approx(eqred),x)];

$$[-0.9999999999999999, 4.000000000000001, 1.0000000000000002]$$

58 On constate qu'il y a un point qui ne semble pas correspondre a une projection d'un point d'intersection. Nous allons l'interpréter maintenant.

```
59 (d1,d2,seq(point(i, couleur=black+point_width_3),i=rac));
```



```
60 solx:=solve(eqred,x);
```

$$\left[ 4 \sqrt{13}-1 \quad -\sqrt{13}-1 \right]$$

```
61 soly:=seq(gcd(subs(x=solx[i],C1),subs(x=solx[i],C2)),i=1..3);
```

$$\left( y^2, y^2 + 6 \cdot \sqrt{13} + 18, y^2 + 6 \cdot \sqrt{13} + 18 \right)$$

62 les ordonnées des points d'abscisse solx[i] sont:

```
63 seq(cSolve(soly[i],y),i=1..3);
```

$$\left( (0, 0), \left( \sqrt{6 \cdot \sqrt{13} - 18}, -\sqrt{6 \cdot \sqrt{13} - 18} \right), \left( 1 \cdot \sqrt{6 \cdot \sqrt{13} + 18}, (-1) \cdot \sqrt{6 \cdot \sqrt{13} + 18} \right) \right)$$

64 On constate que pour solx[3] les ordonnées des points de C1 inter C2 ayant cette abscisse sont complexes conjuguées bien que solx[3] soit réel ce qui explique pourquoi le dessin ne nous donnait que 4 points.

65 -----Exercice-----

```
66 G:=t^2*(x^2+y^2-1)+t*(x*y+y^2-x^2)+(x^2+2*y^2-1)
```

$$t^2 \cdot (x^2 + y^2 - 1) + t \cdot (x \cdot y + y^2 - x^2) + x^2 + 2 \cdot y^2 - 1$$

```
67 dG:=diff(G,t)
```

$$2 \cdot t \cdot (x^2 + y^2 - 1) + x \cdot y + y^2 - x^2$$

```
68 eq:=resultant(G,dG,t)
```

```
69 factor(eq);
```

$$(x^2 + y^2 - 1) \cdot (3 \cdot x^4 + 2 \cdot x^3 \cdot y + 13 \cdot x^2 \cdot y^2 + (-8) \cdot x^2 + (-2) \cdot x \cdot y^3 + 7 \cdot y^4 + (-12) \cdot y^2 + 4)$$

70 c'est divisible par le coefficient de t^2 dans G! En effet, on a calculé un resultant entre un polynôme de degré 2 et un autre de degré 1. Mais en un point où x^2+y^2=1, le degré de ces polynômes chute de 1, et l'on aurait donc du prendre pour un tel point une formule de resultant pour degré inférieur. On a donc rajouté des solutions à notre problème. l'équation de l'enveloppe est donc:

```
71 eqenv:=normal(eq/(coeff(G,t^2)))
```

$$3 \cdot x^4 + 2 \cdot x^3 \cdot y + 13 \cdot x^2 \cdot y^2 + (-8) \cdot x^2 + (-2) \cdot x \cdot y^3 + 7 \cdot y^4 + (-12) \cdot y^2 + 4$$

```
72 Gt:=unapply(G,t)
```

$$t \rightarrow t^2 \cdot (x^2 + y^2 - 1) + t \cdot (x \cdot y + y^2 - x^2) + x^2 + 2 \cdot y^2 - 1$$

```
73 dGt:=unapply(diff(G,t),t)
```

$$t \rightarrow 2 \cdot t \cdot (x^2 + y^2 - 1) + x \cdot y + y^2 - x^2$$

```
74 envel:=implicitplot(eqenv,x=-7..7,y=-7..7,xstep=0.01,ystep=0.01,affichage=blue+line_width_3);
```

Evaluation time: 0.84

Done

