

# $t$ -ANALOGUES DES OPÉRATEURS D'ÉCRANTAGE ASSOCIÉS AUX $q$ -CHARACTÈRES

DAVID HERNANDEZ

RÉSUMÉ. Nous proposons des opérateurs d'écrantage pour la théorie des  $q, t$ -caractères de Nakajima ([4], [5]), analogues aux opérateurs d'écrantage de Frenkel et Reshetikhin relatifs à leur théorie des  $q$ -caractères pour les représentations de dimension finie des algèbres affines quantifiées [2], avec en particulier les mêmes propriétés de symétrie. La théorie de Nakajima, établie dans le cas simplement lacé, utilise des anneaux non-commutatifs. Nous aurons ainsi à considérer des bimodules adaptés à ces structures, mais notre construction étant purement algébrique, elle est étendue au cas non-simplement lacé.

$t$ -ANALOGS OF SCREENING OPERATORS RELATED TO  $q$ -CHARACTERS

ABSTRACT. Frenkel and Reshetikhin introduced screening operators related to  $q$ -characters of finite dimensional representations of quantum affine algebras [2]. We propose  $t$ -analogs of screening operators related to Nakajima's  $q, t$ -characters ([4], [5]) with the same properties of symmetry. Nakajima's approach is geometric and deals with the simply laced case. He used non-commutative rings, so we propose bimodules. But our construction is purely algebraic, and can be extended to the non-simply laced case.

For convenience of the reader we give an english translation of the introduction :

## INTRODUCTION

Let  $q \in \mathbb{C}^*$  such that  $q$  is not a root of unity.

In the case of semi-simple Lie algebras  $\mathfrak{g}$ , the structure of the Grothendieck ring  $\text{Rep}(\mathcal{U}_q(\mathfrak{g}))$  of finite dimensional representations of the quantum algebra  $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$  is well understood, see [6]. It is analogous to the classic case  $q = 1$ . In particular we have ring isomorphisms :

$$\text{Rep}(\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})) \simeq \text{Rep}(\mathfrak{g}) \simeq \mathbb{Z}[\Lambda]^W \simeq \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$$

deduced from the injective homomorphism of characters  $\chi$  :

$$\chi(V) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \dim(V_\lambda) \lambda$$

where  $V_\lambda$  are weight spaces of a representation  $V$  and  $\Lambda$  is the set of weight of  $V$ .

For the general case of Kac-Moody algebras the picture is less clear. In the affine case  $\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})$ , Frenkel and Reshetikhin [2], motivated by the theory of deformed  $W$ -algebras, have recently introduced an injective ring homomorphism of  $q$ -characters :

$$\chi_q : \text{Rep}(\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})) \rightarrow \mathbb{Z}[Y_{i,a}^{\pm 1}]_{1 \leq i \leq n, a \in \mathbb{C}^*} = \mathcal{Y}$$

The construction of  $\chi_q$  uses the universal  $R$ -matrix. The homomorphism  $\chi_q$  allows to understand the ring  $\text{Rep}(\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})) \simeq \mathbb{Z}[X_{i,a}]_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*}$ . The classical limit  $q \rightarrow 1$  of  $\chi_q$  is the usual homomorphism of characters. In fact  $\chi_q$  gives informations about the decomposition in Jordan subspaces for a class  $(\phi_{i,m}^\pm)_{m \in \mathbb{Z}, i \in I}$  of commutative elements of  $\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})$  :

$$\chi_q(V) = \sum_{\gamma} \dim(V_{(\gamma)}) \prod_{i \in I, r=1..k_{\gamma i}} Y_{i, a_{\gamma i r}} \prod_{s=1..l_{\gamma i}} Y_{i, b_{\gamma i r}}^{-1}$$

1

where  $V_{(\gamma)}$  is the Jordan subspace of weight  $\gamma$  :

$$\sum_{m \geq 0} \gamma_{i, \pm m}^{\pm} u^{\pm m} = \gamma_i^{\pm}(u) = q_i^{k_{\gamma_i} - l_{\gamma_i}} \frac{Q_i(uq_i^{-1})R_i(uq_i)}{Q_i(uq_i)R_i(uq_i^{-1})}$$

where  $a_{\gamma_{ir}}$  are roots of the polynomial  $Q_i$  and  $b_{\gamma_{ir}}$  roots of the polynomial  $R_i$ . The homomorphism of  $q$ -characters has a symmetry property analogous to the classic action of the Weyl group  $\text{Im}(\chi) = \mathbb{Z}[\Lambda]^W$  : Frenkel and Reshetikhin defined  $n$  screening operators (with  $A_{i,a} \in \mathcal{Y}$  monomials) :

$$S_i : \mathbb{Z}[Y_{i,a}^{\pm 1}]_{a \in \mathbb{C}^*, i \in I} = \mathcal{Y} \rightarrow \bigoplus_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y} \cdot S_{i,a} / \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y} \cdot (S_{i,aq_i^2} - A_{i,aq_i} \cdot S_{i,a})$$

There is a leibnitz rule ( $S_i(UV) = US_i(V) + VS_i(U)$ ), and  $S_i(Y_a) = Y_a \cdot S_a$ . They conjectured :

$$\text{Im}(\chi_q) = \bigcap_{i \in I} \text{Ker}(S_i)$$

They proved it in the case  $sl_2$  [2], and Frenkel, Mukhin proved it in the general case [3].

These operators give informations about the combinatorial structure of  $q$ -characters. For example :

$$\text{Rep}(\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})) \simeq \text{Im}(\chi_q) = \mathfrak{K} = \bigcap_{i \in I} (\mathbb{Z}[Y_{j,a}^{\pm 1}]_{j \neq i, a \in \mathbb{C}^*} \mathbb{Z}[Y_{i,b} + Y_{i,b} A_{i,bq_i}^{-1}]_{b \in \mathbb{C}^*})$$

In the  $ADE$  case Nakajima introduced  $t$ -analogs of  $q$ -characters with geometrical approach using quiver varieties [4], [5]. He defined maps  $\chi_{q,t}$  et  $\hat{\chi}_{q,t}$  from  $\text{Rep}(\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  to polynomial rings respectively  $\mathcal{Y}_t = \mathbb{Z}[Y_{i,a}^{\pm 1}, t^{\pm}]_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*}$  and  $\hat{\mathcal{Y}}_t = \mathbb{Z}[V_{i,a}, W_{i,a}, t^{\pm}]_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*}$ . From representation theory point of view, it gives more informations about Jordan subspaces. He introduce a new non-commutative multiplication  $*$  on  $\hat{\mathcal{Y}}_t$ .

In this paper we propose  $t$ -analogs of screening operators  $\hat{S}_{i,t}, S_{i,t}$  related to applications  $\chi_{q,t}$  and  $\hat{\chi}_{q,t}$ .

This article is organized as follows. In section 2 we recall the fundamental symmetry property of Frenkel, Reshetikhin's screening operators and some results on Nakajima's ring  $\hat{\mathcal{Y}}_t$ . In section 3 we define operators  $\hat{S}_{t,i}^l$ . We introduce a bimodule structure such that we have a Leibnitz rule. In section 4 we define  $t$ -analogs of screening operators  $\hat{S}_{t,i}$ . In the  $ADE$  case we give an interpretation related to Nakajima's multiplication  $*$ . These operators verify the expected symmetry property in theorem 2 :

$$\bigcap_{i \in I} \text{Ker}(\hat{S}_i) = \hat{\mathfrak{K}} \supseteq \text{Im}(\hat{\chi}_{q,t})$$

In section 5 we define operators  $S_{i,t}$  related to the ring  $\mathcal{Y}_t$ . The diagram :

$$\begin{array}{ccccc} \hat{\mathcal{Y}}_t & \xrightarrow{\hat{S}_{t,i}} & \hat{\mathcal{Y}}_{t,i} & & \\ \hat{\Pi}_t \downarrow & & \downarrow & & \hat{\Pi}_{t,i} \\ \mathcal{Y}_t & \xrightarrow{S_{t,i}} & \mathcal{Y}_{t,i} & & \\ \Pi_t \downarrow & & \downarrow & & \Pi_{t,i} \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{S} & \mathcal{Y}_i & & \end{array}$$

is commutative. We have a symmetry property in theorem 3 :

$$\bigcap_{i \in I} \text{Ker}(S_i) = \mathfrak{K} = \text{Im}(\chi_{q,t})$$

where  $\chi_{q,t}$  is  $\tilde{\chi}_{q,t}$  in [4]. In section 6 we construct involutions analog to the Nakajima's one.

The construction use a bimodule structure on the free left module  $\bigoplus_{a \in \mathbb{C}^*} \hat{\mathcal{Y}}_t S_{i,a}$ , and the  $t$ -analog of

$\sum_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y} \cdot (S_{i,aq_i^2} - A_{i,aq_i} \cdot S_{i,a})$  is a subbimodule. The bimodule structure is given for any  $m \in \hat{\mathcal{Y}}_t$  monomial by :

$$S_{i,a} m = t^{2u_{i,a}(m)} m S_{i,a}$$

## 1. INTRODUCTION

Dans ce qui suit  $q \in \mathbb{C}^*$  est supposé ne pas être une racine de l'unité.

Dans le cas d'une algèbre de Lie semi-simple  $\mathfrak{g}$ , la structure de l'anneau de Grothendieck  $\text{Rep}(\mathcal{U}_q(\mathfrak{g}))$  des représentations de dimensions finie de l'algèbre semi-simple quantifiée  $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$  est bien comprise, voir [6]. En fait on a pu montrer qu'elle est tout à fait analogue à celle du cas classique  $q = 1$  déjà bien connu. On a en particulier des isomorphismes d'anneaux :

$$\text{Rep}(\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})) \simeq \text{Rep}(\mathfrak{g}) \simeq \mathbb{Z}[\Lambda]^W \simeq \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$$

construits à partir d'un morphisme de caractère  $\chi$  tel que pour une représentation  $V$  de sous-espaces de poids  $V_\lambda$  :

$$\chi(V) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \dim(V_\lambda) \lambda$$

où  $\Lambda$  désigne l'ensemble des poids de  $V$ .

Par contre la quantification modifie la théorie des représentations lorsqu'on s'intéresse au cas général des algèbres de Kac-Moody. Dans le cas affine  $\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})$ , Frenkel et Reshetikhin [2], motivés par la théorie des  $W$ -algèbres déformées, ont récemment introduit un morphisme d'anneau injectif, dit de  $q$ -caractères, à valeurs dans un anneau de polynômes de Laurent :

$$\chi_q : \text{Rep}(\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})) \rightarrow \mathbb{Z}[Y_{i,a}^{\pm 1}]_{1 \leq i \leq n, a \in \mathbb{C}^*} = \mathcal{Y}$$

La construction de  $\chi_q$  repose sur l'existence d'une  $R$ -matrice universelle. L'application  $\chi_q$  permet de comprendre l'anneau  $\text{Rep}(\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})) \simeq \mathbb{Z}[X_{i,a}]_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*}$  et lorsqu'on regarde la limite classique  $q = 1$  on retrouve l'application de caractères usuelle. En fait cette application prend en compte la décomposition en sous-espaces de Jordan pour une certaine famille commutante  $(\phi_{i,m}^\pm)_{m \in \mathbb{Z}, i \in I}$  d'éléments de  $\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})$  :

$$\chi_q(V) = \sum_{\gamma} \dim(V_{(\gamma)}) \prod_{i \in I, r=1..k_{\gamma i}} Y_{i, a_{\gamma i r}} \prod_{s=1..l_{\gamma i}} Y_{i, b_{\gamma i r}}^{-1}$$

où  $V_{(\gamma)}$  désigne le sous-espace de Jordan de  $V$  de poids :

$$\sum_{m \geq 0} \gamma_{i, \pm m}^\pm u^{\pm m} = \gamma_i^\pm(u) = q_i^{k_{\gamma i} - l_{\gamma i}} \frac{Q_i(u q_i^{-1}) R_i(u q_i)}{Q_i(u q_i) R_i(u q_i^{-1})}$$

avec  $a_{\gamma i r}$  les racines du polynôme  $Q_i$  et  $b_{\gamma i r}$  les racines du polynôme  $R_i$ .

Le morphisme de  $q$ -caractère vérifie une propriété de symétrie analogue au cas classique de l'action du groupe de Weyl qui veut  $\text{Im}(\chi) = \mathbb{Z}[\Lambda]^W$ . En effet Frenkel et Reshetikhin ont défini  $n$  opérateurs dits d'écrantage (avec  $A_{i,a} \in \mathcal{Y}$  monômes) :

$$S_i : \mathbb{Z}[Y_{i,a}^{\pm 1}]_{a \in \mathbb{C}^*, i \in I} = \mathcal{Y} \rightarrow \bigoplus_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y} \cdot S_{i,a} / \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y} \cdot (S_{i, a q_i^2} - A_{i, a q_i} \cdot S_{i,a})$$

qui sont des dérivations ( $S_i(UV) = U S_i(V) + V S_i(U)$ ), vérifiant  $S_i(Y_a) = Y_a \cdot S_a$ , et ont conjecturé :

$$\text{Im}(\chi_q) = \bigcap_{i \in I} \text{Ker}(S_i)$$

Ils l'ont montré dans le cas  $sl_2$  [2] puis Frenkel et Mukhin ont obtenu le résultat dans le cas général [3].

Ces opérateurs permettent de comprendre la structure combinatoire des  $q$ -caractères. Par exemple :

$$\text{Rep}(\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})) \simeq \text{Im}(\chi_q) = \mathfrak{K} = \bigcap_{i \in I} (\mathbb{Z}[Y_{j,a}^{\pm 1}]_{j \neq i, a \in \mathbb{C}^*} \mathbb{Z}[Y_{i,b} + Y_{i,b} A_{i,b q_i}^{-1}]_{b \in \mathbb{C}^*})$$

Dans le cas où  $\mathfrak{g}$  est de type  $ADE$ , Nakajima a raffiné la théorie en introduisant un  $t$ -analogue des  $q$ -caractères grâce à un point de vue géométrique lié aux variétés de Carquois [4], [5]. Il considère des applications  $\chi_{q,t}$  et  $\hat{\chi}_{q,t}$  de  $\text{Rep}(\mathcal{U}_q(\hat{\mathfrak{g}})) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  vers les anneaux de polynômes respectivement  $\mathcal{Y}_t = \mathbb{Z}[Y_{i,a}^\pm, t^\pm]_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*}$  et  $\hat{\mathcal{Y}}_t = \mathbb{Z}[V_{i,a}, W_{i,a}, t^\pm]_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*}$ . D'un point de vue des représentations, elles permettent

de mieux comprendre la structure de chaque sous-espace de Jordan. Au passage il introduit une nouvelle multiplication  $*$  sur  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  qui n'est pas commutative.

Nous proposons dans cet article des  $t$ -analogues des opérateurs d'écrantage, adaptés aux applications  $\chi_{q,t}$  et  $\hat{\chi}_{q,t}$ .

Dans la deuxième partie, on rappelle la propriété fondamentale de symétrie des opérateurs d'écrantage de Frenkel et Reshetikhin (Théorème 1) ainsi que quelques résultats élémentaires sur l'anneau  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  de Nakajima. On définit dans la troisième partie les opérateurs  $\hat{S}_{t,i}^l$  qui peuvent être interprétés comme des dérivations pour la multiplication usuelle et une certaine structure de bimodule. Dans la quatrième partie on définit les  $t$ -analogues des opérateurs d'écrantage  $\hat{S}_{t,i}$  qui dans le cas où  $\mathfrak{g}$  est de type  $ADE$  peuvent être interprétés comme des dérivations en utilisant la loi  $*$  de Nakajima. Ces opérateurs vérifient la propriété attendue dans le théorème 2 :

$$\bigcap_{i \in I} \text{Ker}(\hat{S}_i) = \hat{\mathfrak{K}} \supseteq \text{Im}(\hat{\chi}_{q,t})$$

On définit dans la cinquième partie des opérateurs  $S_{i,t}$  pour l'anneau  $\mathcal{Y}_t$  rendant le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} \hat{\mathcal{Y}}_t & \xrightarrow{\hat{S}_{t,i}} & \hat{\mathcal{Y}}_{t,i} & & \\ \hat{\Pi}_t \downarrow & & \downarrow & & \hat{\Pi}_{t,i} \\ \mathcal{Y}_t & \xrightarrow{S_{t,i}} & \mathcal{Y}_{t,i} & & \\ \Pi_t \downarrow & & \downarrow & & \Pi_{t,i} \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{S} & \mathcal{Y}_1 & & \end{array}$$

avec une propriété de symétrie dans le théorème 3 :

$$\bigcap_{i \in I} \text{Ker}(S_i) = \mathfrak{K} = \text{Im}(\chi_{q,t})$$

où  $\chi_{q,t}$  est égal au  $\tilde{\chi}_{q,t}$  de [4]. Dans la sixième partie on donne la construction d'involutions analogues à celle de Nakajima.

Notons que la construction repose sur l'existence d'une structure de bimodule sur le module libre à gauche  $\bigoplus_{a \in \mathbb{C}^*} \hat{\mathcal{Y}}_t S_{i,a}$  telle que le  $t$ -analogue de  $\sum_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y} \cdot (S_{i,aq_i^2} - A_{i,aq_i} \cdot S_{i,a})$  soit un sous-bimodule. Cette structure est caractérisée par les relations suivantes, où  $m \in \hat{\mathcal{Y}}_t$  est un monôme :

$$S_{i,a} m = t^{2u_{i,a}(m)} m S_{i,a}$$

## 2. RAPPELS

Soit  $\mathfrak{g}$  une algèbre de Lie simple. On note  $n$  le rang de  $\mathfrak{g}$ ,  $(C_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$  sa matrice de Cartan et  $I = \{1, \dots, n\}$ . On note  $q_i = q^{r_i}$  comme dans [2].

**2.1. Opérateurs d'écrantage** [2], [3]. On considère l'anneau :

$$\mathcal{Y} = \mathbb{Z}[Y_{i,a}^{\pm 1}]_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*}$$

les  $\mathcal{Y}$ -modules libres ( $i \in I$ ) :

$$\mathcal{Y}_i^l = \bigoplus_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y} \cdot S_{i,a}$$

et les  $\mathcal{Y}$ -modules  $\mathcal{Y}_i$  définis respectivement comme  $\mathcal{Y}$ -module quotient de  $\mathcal{Y}_i^l$  :

$$\mathcal{Y}_i = \bigoplus_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y} \cdot S_{i,a} / \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y} \cdot (S_{i,aq_i^2} - A_{i,aq_i} \cdot S_{i,a})$$

par le sous-module  $F_i = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y} \cdot (S_{i,aq^2} - A_{i,aq} \cdot S_{i,a})$ , avec :

$$A_{i,a} = Y_{i,aq^{-1}}^{-1} Y_{i,aq} \prod_{j/C_{j,i}=-1} Y_{j,a}^{-1} \prod_{j/C_{j,i}=-2} Y_{j,aq}^{-1} Y_{j,aq^{-1}}^{-1} \prod_{j/C_{j,i}=-3} Y_{j,aq^2}^{-1} Y_{j,a}^{-1} Y_{j,aq^{-2}}^{-1}$$

On a alors les opérateurs d'écrantage :

$$S_i : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}_i$$

qui sont des dérivations pour le produit de  $\mathcal{Y}$  :

$$S_i(U \cdot V) = U \cdot S_i(V) + V \cdot S_i(U)$$

et qui vérifient pour  $a \in \mathbb{C}^*$  :

$$S_i(Y_{j,a}^{\pm}) = \pm \delta_{i,j} Y_{i,a}^{\pm} S_{i,a}$$

On peut définir de manière analogue  $S_i^l : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}_i^l$ .

**Théorème 1.** *Le noyau de  $S_i$  est le sous-anneau de  $\mathcal{Y}$  :*

$$\text{Ker}(S_i) = \hat{\mathcal{R}}_i = \mathbb{Z}[Y_{j,a}^{\pm}]_{j \neq i, a \in \mathbb{C}^*} \mathbb{Z}[Y_{i,b}(1 + A_{i,bq_i}^{-1})]_{b \in \mathbb{C}^*}$$

2.2. **L'anneau  $\hat{\mathcal{Y}}_t$**  [5]. On considère à présent l'anneau :

$$\hat{\mathcal{Y}}_t = \mathbb{Z}[t, t^{-1}, V_{i,a}, W_{i,a}]_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*}$$

C'est un  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -module libre de base l'ensemble des  $\prod_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} V_{i,a}^{v_{i,a}(m)} W_{i,a}^{w_{i,a}(m)}$  qu'on appellera monômes.

On définit un morphisme d'anneaux :

$$\begin{aligned} \tilde{\Pi}_t : \hat{\mathcal{Y}}_t &\rightarrow \mathcal{Y} \\ m = \prod_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} V_{i,a}^{v_{i,a}(m)} W_{i,a}^{w_{i,a}(m)} &\mapsto \prod_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} Y_{i,a}^{u_{i,a}(m)} \text{ et } t \mapsto 1 \end{aligned}$$

avec pour un tel monôme  $m$  :

$$\begin{aligned} u_{i,a}(m) &= w_{i,a}(m) - v_{i,aq_i^{-1}}(m) - v_{i,aq_i}(m) \\ &+ \sum_{j/C_{j,i}=-1} v_{j,a}(m) + \sum_{j/C_{j,i}=-2} (v_{j,aq}(m) + v_{j,aq^{-1}}(m)) + \sum_{j/C_{j,i}=-3} (v_{j,aq^2}(m) + v_{j,a}(m) + v_{j,aq^{-2}}(m)) \end{aligned}$$

Remarque que l'application  $\tilde{\Pi}_t$  est l'unique morphisme d'anneaux tel que :

$$\tilde{\Pi}_t(W_{i,a}) = Y_{i,a}, \tilde{\Pi}_t(V_{i,a}) = A_{i,a}^{-1}, \tilde{\Pi}_t(t) = 1$$

On peut définir pour un monôme  $m = \prod_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} Y_{i,a}^{u_{i,a}(m)} \in \mathcal{Y}$  les  $u_{i,a}(m)$  de manière évidente, et alors ces quantités sont conservées par  $\tilde{\Pi}_t$ .

Pour  $m \in \hat{\mathcal{Y}}$  monôme  $i$ -dominant, c'est à dire vérifiant  $\forall a \in \mathbb{C}^*, u_{i,a}(m) \geq 0$ , on pose :

$$E_i(m) = m \prod_{a \in \mathbb{C}^*} \sum_{r_a=0 \dots u_{i,a}(m)} t^{r_a(u_{i,a}(m)-r_a)} \begin{bmatrix} u_{i,a}(m) \\ r_a \end{bmatrix}_t V_{i,aq_i}^{r_a}$$

et on note  $\hat{\mathcal{R}}_{t,i}$  le sous  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -module de  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  engendré par ces  $E_i(m)$ . On pose alors :

$$\hat{\mathcal{R}}_t = \bigcap_{i \in I} \hat{\mathcal{R}}_{t,i}$$

On note  $\hat{A}$  l'ensemble des monômes de  $\hat{\mathcal{Y}}_t$ ,  $\hat{B}_i \subset \hat{A}$  l'ensemble des monômes  $i$ -dominants de  $\hat{\mathcal{Y}}_t$ .

**Lemme 1.** *Pour chaque  $i \in I$ , on a une décomposition en somme directe de  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -modules :*

$$\hat{\mathcal{Y}}_t = \hat{\mathcal{R}}_{t,i} \oplus \bigoplus_{m \in \hat{A} - \hat{B}_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]m = \left( \bigoplus_{m \in \hat{B}_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]E_i(m) \right) \oplus \left( \bigoplus_{m \in \hat{A} - \hat{B}_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]m \right)$$

*Démonstration:*

Notons d'abord que pour  $m \in \hat{B}_i$ , on peut écrire  $E_i(m) = m + f(m)$  avec

$$f(m) = m \left( \left( \prod_{a \in \mathbb{C}^*} \sum_{r_a=0..u_{i,a}} t^{r_a(u_{i,a}-r_a)} \begin{bmatrix} u_{i,a} \\ r_a \end{bmatrix}_t V_{i,aq_i}^{r_a} \right) - 1 \right)$$

qui ne fait intervenir que des monômes de  $i$ -poids  $wt_i(m') = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} u_{i,a}(m')$  strictement inférieur à celui de  $m$ .

Considérons une combinaison linéaire qui s'annule :

$$\sum_{m \in \hat{B}_i} \lambda_m(t) E_i(m) + \sum_{m \in \hat{A} - \hat{B}_i} \mu_m(t) m = 0$$

avec les  $\lambda_m(t), \mu_m(t) \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ . Si on suppose qu'un des  $\lambda(t) \neq 0$ , soit  $m_1 \in \hat{B}_i$  un monôme dominant de  $i$ -poids maximal parmi ceux qui vérifient  $\lambda_m(t) \neq 0$ . Alors le monôme  $m_1$  ne peut apparaître que dans  $E_i(m_1)$  puisque si il apparaissait dans  $E_i(m_2)$ , le  $i$ -poids de  $m_2$  serait strictement plus grand que le sien. Donc  $\lambda_{m_1}(t) = 0$ , contradiction. Donc tous les  $\lambda_m(t)$  sont nuls, et alors  $\sum_{m \in \hat{A} - \hat{B}_i} \mu_m(t) m = 0$  implique la

nullité des  $\mu_m(t)$ .

Il nous reste à montrer que tout  $m \in \hat{A}$  est dans  $F = \left( \bigoplus_{m \in \hat{B}_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}] E_i(m) \right) \oplus \left( \bigoplus_{m \in \hat{A} - \hat{B}_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}] m \right)$ . C'est

clair si  $m \in \hat{A} - \hat{B}_i$ . Dans le cas  $m \in \hat{B}_i$ , montrons le par récurrence sur le  $i$ -poids de  $m$ . Si  $m$  est de  $i$ -poids 0, tous les  $u_{i,a}(m)$  sont nuls et  $m = E_i(m)$ . Dans le cas général, on a :

$$E_i(m) = m + f(m) = m + \sum_{m' \in \hat{A}} \lambda_{m'}(t) m'$$

avec  $\lambda_{m'}(t)$  qui peut être non nul seulement si le  $i$ -poids de  $m'$  est strictement inférieur à celui de  $m$ . Alors :

$$m = E_i(m) - \sum_{m' \in \hat{A} - \hat{B}_i} \lambda_{m'}(t) m' - \sum_{m' \in \hat{B}_i} \lambda_{m'}(t) m'$$

avec  $E_i(m) \in F$ ,  $\sum_{m' \in \hat{A} - \hat{B}_i} \lambda_{m'}(t) m' \in F$  et par hypothèse de récurrence  $\sum_{m' \in \hat{B}_i} \lambda_{m'}(t) m' \in F$ .  $\square$

### 3. LES OPÉRATEURS $\hat{S}_{t,i}^l$

**3.1. Définition.** On considère les  $\hat{\mathcal{Y}}_t$ -modules libres suivants ( $i \in I$ ) :

$$\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l = \bigoplus_{a \in \mathbb{C}^*} \hat{\mathcal{Y}}_t \cdot S_{i,a}$$

On a alors une application naturelle :

$$\tilde{\Pi}_{t,i}^l : \hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l \rightarrow \mathcal{Y}_i^l$$

déduite de  $\tilde{\Pi}_t$  :

$$\tilde{\Pi}_{t,i}^l \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \lambda_a \cdot S_{i,a} \right) = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \tilde{\Pi}_t(\lambda_a) \cdot S_{i,a}$$

**Définition 1.** On note  $\hat{S}_{t,i}^l$  l'application  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -linéaire  $\hat{S}_{t,i}^l : \hat{\mathcal{Y}}_t \rightarrow \hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$  qui prend sur un monôme  $m \in \hat{A}$  la valeur :

$$\hat{S}_{t,i}^l(m) = m \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a}(m) \geq 0} (1 + \dots + t^{2(u_{i,a}(m)-1)}) S_{i,a} - \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a}(m) < 0} (t^{-2} + \dots + t^{2u_{i,a}(m)}) S_{i,a} \right)$$

**Lemme 2.** *Le diagramme (1) suivant est commutatif :*

$$\begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{Y}}_t & \xrightarrow{\hat{S}_{t,i}^l} & \hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l \\ \tilde{\Pi}_t \downarrow & & \downarrow \tilde{\Pi}_{t,i}^l \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{S_i^l} & \mathcal{Y}_{1,i}^l \end{array}$$

*Démonstration:*

Toutes les applications sont  $\mathbb{Z}$ -linéaires, il suffit donc de regarder un monôme  $m \in \hat{A}$  et  $\lambda(t) \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  :

$$\begin{aligned} & (\tilde{\Pi}_{t,i}^l \circ \hat{S}_{t,i}^l)(\lambda(t)m) \\ &= \lambda(1)\tilde{\Pi}_{t,i}^l(m(\sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} \geq 0} (1 + \dots + t^{2(u_{i,a}-1)})S_{i,a} - \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} < 0} (t^{-2} + \dots + t^{2u_{i,a}})S_{i,a})) \\ &= \lambda(1)\tilde{\Pi}_t(m)(\sum_{a \in \mathbb{C}^*} u_{i,a}S_{i,a}) \\ &= S_i^l(\lambda(1)\tilde{\Pi}_t(m)) \\ &= S_i^l(\tilde{\Pi}_t(\lambda(t)m)) \end{aligned}$$

□

### 3.2. Interprétation de $\hat{S}_{t,i}^l$ en terme de dérivation.

#### 3.2.1. Des lois de bimodule sur $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$ .

**Lemme 3.** *Il existe sur  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$  une unique structure de bimodule pour la multiplication usuelle de  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  telle que la structure à gauche soit la structure naturelle, que pour tout  $a \in \mathbb{C}^*$  et tout monôme  $m \in \hat{A}$  :*

$$S_{i,a} \cdot m = t^{2u_{i,a}(m)} m \cdot S_{i,a}, \quad S_{i,a} \cdot t = t \cdot S_{i,a}$$

*Démonstration:*

L'unicité est claire, car la compatibilité entre les structures à gauche et à droite impose, pour  $\lambda_a \in \hat{\mathcal{Y}}_t$ ,  $\mu_m \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  :

$$\left( \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \lambda_a \cdot S_{i,a} \right) \cdot \sum_m \mu_m m = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \lambda_a \cdot \left( S_{i,a} \cdot \sum_m \mu_m m \right) = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \lambda_a \cdot \sum_m \mu_m t^{2u_{i,a}(m)} m \cdot S_{i,a}$$

Pour montrer que la structure  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -linéaire de module à droite est bien définie, il suffit de vérifier que pour deux monômes  $m_1, m_2 \in \hat{A}$  on a  $S_{i,a} \cdot (m_1 \cdot m_2) = (S_{i,a} \cdot m_1) \cdot m_2$ . Ceci découle du fait que  $u_{i,a}(m_1 \cdot m_2) = u_{i,a}(m_1) + u_{i,a}(m_2)$ . La compatibilité entre les deux structures de modules est alors immédiate. □

On peut généraliser ce qui précède au cas d'une multiplication tordue sur  $\hat{\mathcal{Y}}_t$ . Pour tout bicaractère  $d : \hat{A} \times \hat{A} \rightarrow \mathbb{Z}$ , c'est-à-dire vérifiant :

$$d(m_1 \cdot m_2, m_3) = d(m_1, m_3) + d(m_2, m_3), \quad d(m_1, m_2 \cdot m_3) = d(m_1, m_2) + d(m_1, m_3)$$

on a une loi de composition interne  $*_d$  associative et  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -linéaire sur  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  en posant :

$$m_1 *_d m_2 = t^{2d(m_1, m_2)} m_1 \cdot m_2$$

Remarquons que pour obtenir une loi associative, il suffit de demander que  $d$  vérifie sur des monômes  $m_1, m_2, m_3$ , la propriété de cocycle :

$$-d(m_2, m_3) + d(m_1 m_2, m_3) - d(m_1, m_2 m_3) + d(m_1, m_2) = 0$$

ce qui est le cas pour les bicaractères.

On peut munir naturellement  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$  d'une structure de  $\hat{\mathcal{Y}}_t$ -module à gauche pour la multiplication  $*_d$  en posant pour  $U \in \hat{\mathcal{Y}}_t$  :

$$U *_d \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \lambda_a \cdot S_a \right) = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} (U *_d \lambda_a) \cdot S_{i,a}$$

et de manière complètement analogue au cas  $d = 0$  on fait de  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$  un bimodule en posant :

$$S_{i,a} *_d m = t^{2u_{i,a}(m)} m *_d S_{i,a}, \quad S_{i,a} *_d t = t *_d S_{i,a}$$

3.2.2.  $\hat{S}_{t,i}^l$  comme dérivation pour  $*_d$ .

**Proposition 1.** *Pour  $d$  bicaratère, l'application  $\hat{S}_{t,i}^l$  est une dérivation par rapport à la multiplication  $*_d$  :*

$$\forall U, V \in \hat{\mathcal{Y}}_t, \hat{S}_{t,i}^l(U *_d V) = U *_d \hat{S}_{t,i}^l(V) + \hat{S}_{t,i}^l(U) *_d V$$

*Démonstration:*

Pour vérifier la propriété de dérivation, et il suffit de montrer que pour deux monômes  $m, m' \in \hat{A}$  on a  $\hat{S}_{t,i}^l(m *_d m') = \hat{S}_{t,i}^l(m) *_d m' + m *_d \hat{S}_{t,i}^l(m')$ . Calculons en effet :

$$\begin{aligned} & \hat{S}_{t,i}^l(m) *_d m' + m *_d \hat{S}_{t,i}^l(m') \\ = & m *_d m' \\ & \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} \geq 0} (1 + \dots + t^{2(u_{i,a}-1)}) t^{2u_{i,a}'} S_{i,a} - \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} < 0} (t^{-2} + \dots + t^{2u_{i,a}'}) t^{2u_{i,a}'} S_{i,a} \right. \\ & \left. + \sum_{b \in \mathbb{C}^* / u_{i,b}' \geq 0} (1 + \dots + t^{2(u_{i,b}'-1)}) S_{i,b} - \sum_{b \in \mathbb{C}^* / u_{i,b}' < 0} (t^{-2} + \dots + t^{2u_{i,b}'}) S_{i,b} \right) \\ = & m *_d m' \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} + u_{i,a}' \geq 0} (1 + \dots + t^{2(u_{i,a} + u_{i,a}' - 1)}) S_{i,a} \right. \\ & \left. - \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} + u_{i,a}' < 0} (t^{-2} + \dots + t^{2(u_{i,a} + u_{i,a}' )}) S_{i,a} \right) \\ = & \hat{S}_{t,i}^l(m *_d m') \end{aligned}$$

□

On a ainsi une caractérisation de  $\hat{S}_{t,i}^l$  comme l'unique dérivation pour la loi usuelle,  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -linéaire, prenant les valeurs sur les générateurs :

$$\hat{S}_{t,i}^l(V_{i,a}) = -t^{-2} V_{i,a} (S_{i,aq_i^{-1}} + S_{i,aq_i}) \text{ et } \hat{S}_{t,i}^l(W_{j,a}) = \delta_{i,j} W_{i,a} \cdot S_{i,a}$$

$$\hat{S}_{t,i}^l(V_{j,a}) = \delta_{C_{i,j}, -1} V_{j,a} S_{i,a} + \delta_{C_{i,j}, -2} V_{j,a} (S_{i,aq} + S_{i,aq^{-1}}) + \delta_{C_{i,j}, -3} V_{j,a} (S_{i,aq^{-2}} + S_{i,a} + S_{i,aq^2})$$

pour  $j \neq i$ .

#### 4. LES $t$ -OPÉRATEURS D'ÉCRANTAGE $\hat{S}_{t,i}$

##### 4.1. Définition de $\hat{S}_{t,i}$ .

**Définition 2.** *On considère le  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -sous module de  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$  :*

$$\hat{F}_{t,i} = \sum_{a \in \mathbb{C}^*, m \in \hat{A}} \mathbb{Z}[t, t^{-1}] m (V_{i,aq_i} t^{2u_{i,aq_i}(m)} S_{i,aq_i^2} - t^2 S_{i,a})$$

Le module quotient obtenu est noté :

$$\hat{\mathcal{Y}}_{t,i} = \hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l / \hat{F}_{t,i}$$

L'application obtenue à partir de  $\hat{S}_{t,i}^l$  par composition avec la projection  $\hat{p}_{t,i}$  de  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$  sur  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}$  est notée  $\hat{S}_{t,i}$ .

Nous allons montrer, en particulier dans le théorème 2, que ces opérateurs peuvent être considérés comme des  $t$ -analogues des opérateurs d'écrantage.

**Lemme 4.** *L'application  $\tilde{\Pi}_{t,i}^l$  donne naturellement une application  $\tilde{\Pi}_{t,i}$  rendant le diagramme (2) suivant commutatif :*

$$\begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l & \longrightarrow & \hat{\mathcal{Y}}_{1,i,t} \\ \tilde{\Pi}_{t,i}^l \downarrow & & \downarrow \tilde{\Pi}_{t,i} \\ \mathcal{Y}_i^l & \longrightarrow & \mathcal{Y}_i \end{array}$$



*Démonstration:*

Il suffit de vérifier que l'application  $\mathbb{Z}$ -linéaire  $\tilde{\Pi}_{t,i}^l$  passe au quotient. Pour

$$x = \sum_{a \in \mathbb{C}^*, m \in \hat{A}} \lambda_{m,a} m(V_{i,aq_i} t^{2u_{i,aq_i^2}(m)} S_{i,aq_i^2} - t^2 S_{i,a}) \in \hat{F}_{t,i}$$

on a :

$$\tilde{\Pi}_{t,i}(x) = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \lambda_{m,a}(1) \Pi_t(m) (A_{i,aq_i}^{-1} \cdot S_{i,aq_i^2} - S_{i,a}) \in F_i$$

□

**Proposition 2.** *On a le diagramme commutatif suivant :*

$$\begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{Y}}_t & \xrightarrow{\hat{S}_{t,i}} & \hat{\mathcal{Y}}_{t,i} \\ \tilde{\Pi}_t \downarrow & & \downarrow \tilde{\Pi}_{t,i} \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{S_i} & \mathcal{Y}_i \end{array}$$

*Démonstration:*

La commutativité du diagramme provient de la commutativité des diagrammes (1) et (2). □

Soit  $(\hat{\mathcal{Y}}_t)_i = \mathbb{Z}[V_{i,a}, W_{i,a}]_{a \in \mathbb{C}^*} \subset \hat{\mathcal{Y}}_t$ . On définit alors  $\pi_i : \hat{\mathcal{Y}} \rightarrow (\hat{\mathcal{Y}}_t)_i$  comme l'unique morphisme d'anneaux  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -linéaire tel que :

$$\begin{aligned} \pi_i(W_{i,a}) &= W_{i,a}, \quad \pi_i(V_{i,a}) = V_{i,a} \\ \pi_i(W_{j,a}) &= 1 \text{ si } j \neq i \\ \pi_i(V_{j,a}) &= 1 \text{ si } C_{i,j} = 0 \\ \pi_i(V_{j,a}) &= W_{i,a} \text{ si } C_{i,j} = -1 \\ \pi_i(V_{j,a}) &= W_{i,aq} W_{i,aq^{-1}} \text{ si } C_{i,j} = -2 \\ \pi_i(V_{j,a}) &= W_{i,aq^2} W_{i,a} W_{i,aq^{-2}} \text{ si } C_{i,j} = -3 \end{aligned}$$

Pour un monôme  $m \in \hat{A}$ , on a alors  $u_{i,a}(m) = u_{i,a}(\pi_i(m))$  pour  $a \in \mathbb{C}^*$ .

**Proposition 3.** *Le noyau de l'application  $\hat{S}_{t,i}$  contient  $\hat{\mathcal{K}}_{t,i}$ .*

*Démonstration:*

Soit  $m \in \hat{A}$  un monôme  $i$ -dominant. Dans  $S_{t,i}^l(E_i(m))$ , on peut factoriser tous les termes par  $m$ , et notons  $\frac{\hat{S}_{t,i}^l(E_i(m))}{m} \in \hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$  la quantité obtenue. Elle ne dépend que des  $u_{i,a}(m)$  ( $a \in \mathbb{C}^*$ ), et donc :

$$\frac{\hat{S}_{t,i}^l(E_i(m))}{m} = \frac{\hat{S}_{t,i}^l(E_i(\pi_i(m)))}{\pi_i(m)}$$

Remarquons de plus que les  $u_{i,a}$  étant conservés, on a :

$$\hat{S}_{t,i}^l(E_i(m)) \in \hat{F}_{t,i} \Leftrightarrow \hat{S}_{t,i}^l(E_i(\pi_i(m))) \in \hat{F}_{t,i}$$

En conséquence il nous suffit de montrer  $\hat{S}_{t,i}^l(E_i(m)) = 0$  pour  $m \in \hat{B}_i \cap (\hat{\mathcal{Y}}_t)_i$ . Mais alors tout se passe comme si on travaillait avec  $\mathfrak{g} = \mathcal{U}_{q_i}(sl_2)$ . On est ainsi ramené au cas *ADE* qui sera établie plus bas, indépendamment de ce qui précède, dans proposition 5. □

**4.2. Interprétation de  $\hat{S}_{t,i}$  comme dérivation dans le cas *ADE*.** Dans cette sous-partie on se restreint au cas où  $\mathfrak{g}$  est de type *ADE*. On a alors tous les  $q_i = q$  et la matrice de Cartan est symétrique.

4.2.1. *Rappels [5] et compléments sur la loi  $*$  de Nakajima.* On pose pour deux monômes  $m_1, m_2 \in \hat{A}$  :

$$\begin{aligned} d_N(m_1, m_2) &= \sum_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} (v_{i,aq}(m_1)u_{i,a}(m_2) + w_{i,aq}(m_1)v_{i,a}(m_2)) \\ &= \sum_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} (u_{i,a}(m_1)v_{i,aq^{-1}}(m_2) + v_{i,a}(m_1)w_{i,aq^{-1}}(m_2)) \end{aligned}$$

Ce bicaractère, introduit par Nakajima dans [4] et [5], permet comme précédemment de définir une nouvelle multiplication sur  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  en posant pour  $m_1, m_2$  deux monômes :

$$m_1 *_{d_N} m_2 = t^{2d_N(m_1, m_2)} m_1 . m_2$$

avec  $.$  la multiplication usuelle. On notera dans la suite simplement  $d$  et  $*$ . Cette nouvelle multiplication  $*$  n'est pas commutative.

Notons que  $\hat{\mathcal{K}}$  est une partie de  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  stable pour la multiplication  $*$  ([5]).

**Lemme 5.** *Soit  $m \in \hat{A}$  un monôme,  $i \in I$  et  $a \in \mathbb{C}^*$ . On a alors :*

$$V_{i,aq} * m = t^{2(u_{i,a}(m) - u_{i,aq^2}(m))} m * V_{i,aq} = t^{2u_{i,a}(m)} V_{i,aq} . m$$

C'est une conséquence immédiate de

$$d(V_{i,aq}, m) = u_{i,a}(m) \text{ et } d(m, V_{i,aq}) = u_{i,aq^2}(m)$$

**Lemme 6.** *Soit  $(m_1, \dots, m_p)$  des monômes tels qu'il existe un  $a \in \mathbb{C}^*$  vérifiant pour tout  $r$ ,  $u_{i,a}(m_r) = 1$  et  $u_{i,b}(m_r) = 0$  pour  $b \neq a$ . Alors il existe  $\alpha \in \mathbb{Z}$  tel que :*

$$(m_1 * (1 + V_{i,aq})) * (m_2 * (1 + V_{i,aq})) * \dots * (m_p * (1 + V_{i,aq})) = t^\alpha m_1 \dots m_p \sum_{r=0..p} t^{r(p-r)} \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix}_t V_{i,aq}^r$$

*Démonstration:*

On procède par récurrence sur  $p$  en s'appuyant sur le lemme 5. Pour  $p = 1$ , on a  $m_1 * V_{i,aq} = m_1 V_{i,aq}$  et on a le résultat avec  $\alpha = 1$ . Ensuite dans le cas général :

$$\begin{aligned} &(m_1 * (1 + V_{i,aq})) * (m_2 * (1 + V_{i,aq})) * \dots * (m_{p+1} * (1 + V_{i,aq})) \\ &= t^\alpha (m_1 + m_1 V_{i,aq}) * (m_2 \dots m_{p+1} \sum_{r=0..p} t^{r(p-r)} \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix}_t V_{i,aq}^r) \\ &= t^{\alpha+2d(m_1, m_2 \dots m_{p+1})} m_1 m_2 \dots m_{p+1} \sum_{r=0..p} t^{r(p-r)} \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix}_t V_{i,aq}^r \\ &+ t^{\alpha+2d(m_1, m_2 \dots m_{p+1})} m_1 m_2 \dots m_{p+1} \sum_{r=0..p} t^{r(p-r)} \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix}_t t^{2p-2r} V_{i,aq}^{r+1} \\ &= t^{\alpha+2d(m_1, m_2 \dots m_{p+1})} m_1 m_2 \dots m_{p+1} \sum_{r=0..p+1} (t^{r(p-r)} \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix}_t + t^{(r-1)(p-r+1)} \begin{bmatrix} p \\ r-1 \end{bmatrix}_t t^{2p-2r+2}) V_{i,aq}^r \end{aligned}$$

Et on conclut en remarquant :

$$t^{r(p-r)} \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix}_t + t^{(r-1)(p-r+1)} \begin{bmatrix} p \\ r-1 \end{bmatrix}_t t^{2p-2r+2} = t^{r(p+1-r)} \begin{bmatrix} p+1 \\ r \end{bmatrix}_t$$

□

On a en particulier le résultat :

**Lemme 7.** *Soit  $m$  un monôme tel qu'il existe un  $a \in \mathbb{C}^*$  vérifiant  $u_{i,a}(m) = 1$  et  $u_{i,b}(m) = 0$  pour  $b \neq a$ . Alors pour  $l \geq 0$  :*

$$[m(1 + V_{i,aq})]^{*l} = m^l \sum_{r=0..l} t^{r(l-r)} \begin{bmatrix} l \\ r \end{bmatrix}_t V_{i,aq}^r$$

On peut exprimer les  $E_i(m)$  en utilisant la loi  $*$  :

**Proposition 4.** *On fixe un  $i \in I$ . Soit  $m \in \hat{B}_i$  un monôme  $i$ -dominant. Pour  $a \in \mathbb{C}^*$ , on considère la suite  $(Z_{i,a}) = (Z_{i,a,l})_{1 \leq l \leq z_{i,a}}$  formée de*

$$z_{i,a} = w_{i,a} + \sum_{j/C_{j,i}=-1} v_{j,a} = u_{i,a} + v_{i,aq} + v_{i,aq^{-1}}$$

termes où  $W_{i,a}$  apparaît  $w_{i,a}$  fois et pour  $j$  tel que  $C_{j,i} = -1$ ,  $V_{j,a}$  apparaît  $v_{j,a}$  fois :

$$\{W_{i,a}, \dots, W_{i,a}, V_{j_1,a}, \dots, V_{j_1,a}, V_{j_2,a}, \dots, V_{j_m,a}\} = \{Z_{i,a,1}, \dots, Z_{i,a,z_{i,a}}\}$$

Alors il existe un unique  $\beta \in \mathbb{Z}$  tel que :

$$t^\beta E_i(m) = \left( \prod_{j \neq i, a \in \mathbb{C}^*}^* W_{j,a} \right) * \left( \prod_{j/C_{j,i}=0, a \in (\mathbb{C}^*/q^{2\mathbb{Z}}), r \in \mathbb{Z}}^{\rightarrow} V_{j,aq^{2r}} \right) * \left( \prod_{a \in (\mathbb{C}^*/q^{2\mathbb{Z}})}^* \prod_{r \in \mathbb{Z}}^* m_{i,a,r} \right)$$

avec :

$$m_{i,a,r} = (Z_{i,a,1} * (1 + V_{i,aq})) * \dots * (Z_{i,a,u_{i,a}} * (1 + V_{i,aq})) \\ * (Z_{i,a,u_{i,a}+1} * V_{i,aq} * Z_{i,aq^2, u_{i,aq^2} + v_{i,aq^3} + 1}) * \dots * (Z_{i,a,u_{i,a} + v_{i,aq}} * V_{i,aq} * Z_{i,aq^2, u_{i,aq^2} + v_{i,aq^3} + v_{i,aq}})$$

*Démonstration:*

On commence par expliciter  $E_i(m)$  :

$$E_i(m) = m \prod_{a \in \mathbb{C}^*} \left( \sum_{r_a=0..u_{i,a}(m)} t^{r_a(u_{i,a}(m)-r_a)} \begin{bmatrix} u_{i,a}(m) \\ r_a \end{bmatrix}_t V_{i,aq}^{r_a} \right)$$

Si on ne tient pas compte des  $t$ , l'expression annoncée est correcte puisqu'on a le bon nombre  $v_{i,aq}$  de  $V_{i,aq}$  et tous les  $Z_{i,a,l}$  pour  $l = 1..u_{i,a} + v_{i,aq} + v_{i,aq^{-1}}$ . Le seul problème est l'inhomogénéité de  $E_i(m)$  du fait des puissances de  $V_{i,aq}$ .

Les seuls facteurs de  $m$  qui contribuent aux  $u_{i,b}(m)$  sont les  $W_{i,a}, V_{i,a}$  et les  $V_{j,a}$  avec  $C_{j,i} = -1$ . Mais ce sont exactement les facteurs qui posent problème avec  $V_{i,aq}$  d'après le lemme 5. On en déduit une première expression :

$$t^\alpha E_i(m) = \left( \prod_{j \neq i, a \in \mathbb{C}^*}^* W_{j,a} \right) * \left( \prod_{j/C_{j,i}=0, a \in (\mathbb{C}^*/q^{2\mathbb{Z}}), r \in \mathbb{Z}}^{\rightarrow} V_{j,aq^{2r}} \right) * (m' \sum_{r_a=0..u_{i,a}(m)} t^{r_a(u_{i,a}(m)-r_a)} \begin{bmatrix} u_{i,a}(m) \\ r_a \end{bmatrix}_t V_{i,aq}^{r_a})$$

avec

$$m' = \left( \prod_{a \in \mathbb{C}^*} W_{i,a}^{w_{i,a}} V_{i,a}^{v_{i,a}} \right) \left( \prod_{a \in \mathbb{C}^*, j/C_{j,i}=-1} V_{j,a}^{v_{j,a}} \right) \\ = \prod_{a \in \mathbb{C}^*} \left( \prod_{l=1..u_{i,a}} Z_{i,a,l} \right) \left( \prod_{r=1..v_{i,aq}} Z_{i,a, u_{i,a} + r} V_{i,aq} Z_{i,aq^2, u_{i,aq^2} + v_{i,aq^3} + r} \right)$$

Il nous suffit donc de montrer qu'il existe  $\gamma \in \mathbb{Z}$  tel que :

$$E_i(m') = m' \sum_{r_a=0..u_{i,a}(m)} t^{r_a(u_{i,a}(m)-r_a)} \begin{bmatrix} u_{i,a}(m) \\ r_a \end{bmatrix}_t V_{i,aq}^{r_a} = t^{-\gamma} \left( \prod_{a \in \mathbb{C}^*/q^{2\mathbb{Z}}}^* \prod_{r \in \mathbb{Z}}^* m_{i,a,r} \right)$$

Or d'après le lemme 6, le facteur  $Z_{i,a,1} \dots Z_{i,a, u_{i,a}(m)} \sum_{r_a=0..u_{i,a}(m)} t^{r_a(u_{i,a}(m)-r_a)} \begin{bmatrix} u_{i,a}(m) \\ r_a \end{bmatrix}_t V_{i,aq}^{r_a}$  est égal à une puissance de  $t$  près à  $(Z_{i,a,1} * (1 + V_{i,aq})) * \dots * (Z_{i,a, u_{i,a}} * (1 + V_{i,aq}))$ . Il ne reste plus qu'à vérifier que les facteurs restant  $\prod_{a \in \mathbb{C}^*} \left( \prod_{r=1..v_{i,aq}} Z_{i,a, u_{i,a} + r} V_{i,aq} Z_{i,aq^2, u_{i,aq^2} + v_{i,aq^3} + r} \right)$  ne posent pas de problème vis à vis de l'inhomogénéité en puissances de  $V_{i,aq}$ , mais c'est le cas car pour tout  $r \in \mathbb{Z}$  :

$$u_{i,aq^{2r}} (Z_{i,a, u_{i,a} + l} * V_{i,aq} * Z_{i,aq^2, u_{i,aq^2} + v_{i,aq^3} + l}) = 0$$

□

4.2.2. *Une structure de bimodule sur  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}$  pour la loi  $*$ .*

**Lemme 8.** *Le sous  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  module  $\hat{F}_{t,i}$  de  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$  est en fait un sous-module à gauche pour la loi  $*$  :*

$$\hat{F}_{t,i} = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \hat{\mathcal{Y}}_t * (V_{i,aq} \cdot S_{i,aq^2} - t^2 S_{i,a})$$

et même un sous-bimodule  $\hat{\mathcal{Y}}_t * \hat{F}_{t,i} = \hat{F}_{t,i} * \hat{\mathcal{Y}} = \hat{F}_{t,i}$ .

*Démonstration:*

La première propriété découle directement du lemme 5 qui donne pour  $m \in \hat{A}$  :

$$m * (V_{i,aq} \cdot S_{i,aq^2} - t^2 S_{i,a}) = t^{2u_{i,aq^2}(m)} m V_{i,aq} S_{i,aq^2} - t^2 m S_{i,a}$$

Pour la propriété de sous-bimodule, soit  $m \in \hat{A}$  un monôme. En utilisant le lemme 5, on a pour  $\lambda_a \in \hat{\mathcal{Y}}_t$  :

$$\begin{aligned} \lambda_a * (V_{i,aq} \cdot S_{i,aq^2} - t^2 S_{i,a}) * m &= \lambda_a * (t^{2u_{i,aq^2}(m)} V_{i,aq} * m \cdot S_{i,aq^2} - t^{2+2u_{i,a}(m)} m \cdot S_{i,a}) \\ &= t^{2u_{i,a}(m)} \lambda_a * m * (V_{i,aq} \cdot S_{i,aq^2} - t^2 S_{i,a}) \in \hat{F}_{t,i} \end{aligned}$$

□

On peut ainsi munir naturellement  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}$  d'une structure de bimodule.

4.2.3.  $\hat{S}_{t,i}$  est une dérivation. Le résultat suivant, qui justifie entre autre les constructions précédentes, permet en particulier d'obtenir la proposition 3 :

**Proposition 5.** *L'application  $\hat{S}_{t,i}$  est une dérivation pour le produit  $*$  et son noyau contient  $\hat{\mathcal{K}}_{t,i}$ .*

*Démonstration:*

La propriété de dérivation est conservée : en effet pour  $U, V \in \hat{\mathcal{Y}}_t$  on a :

$$\hat{S}_{t,i}(U * V) = \hat{p}_{t,i}(U * \hat{S}_{t,i}^l(V)) + \hat{p}_{t,i}(\hat{S}_{t,i}(U) * V) = U * \hat{p}_{t,i}(\hat{S}_{t,i}^l(V)) + \hat{p}_{t,i}(\hat{S}_{t,i}(U)) * V = U * \hat{S}_{t,i}(V) + \hat{S}_{t,i}(U) * V$$

Pour montrer que  $\hat{\mathcal{K}}_{t,i} \subset \text{Ker}(\hat{S}_{t,i})$ , considérons un monôme dominant  $m$ , et décomposons en utilisant la proposition 4 sous la forme d'un produit pour  $*$ . En utilisant la propriété de dérivation de  $\hat{S}_{t,i}$ , il nous suffit d'obtenir que chacun des termes est annulé. Or pour  $a \in \mathbb{C}^*$  :

$$\begin{aligned} \hat{S}_{t,i}(Z_{i,a,k} * (1 + V_{i,aq})) &= Z_{i,a,k} \cdot S_{i,a} - t^{-2} Z_{i,a,k} * V_{i,aq} \cdot S_{i,aq^2} = Z_{i,a,k} * (S_{i,a} - t^{-2} V_{i,aq} S_{i,aq^2}) = 0 \\ \hat{S}_{t,i}^l(Z_{i,a,k} * V_{aq} * Z_{i,aq^2,k'}) &= 0 \end{aligned}$$

car pour tout  $b \in \mathbb{C}^*$ ,  $u_{i,b}(Z_{i,a,k} * V_{aq} * Z_{i,aq^2,k'}) = 0$  □

4.3. **Interprétation de  $\hat{S}_{t,i}$  dans le cas général.** Dans le cas général, on ne dispose pas de bicaractère vérifiant les deux relations fondamentales du cas *ADE* pour tout  $i \in I$

$$d(V_{i,aq_i}, m) = u_{i,a}(m) \text{ et } d(m, V_{i,aq_i}) = u_{i,aq_i^2}(m)$$

Par exemple, pour  $\mathfrak{g}$  de type  $B_2$ , on a  $C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$  (la matrice de Cartan dans [2] est la transposée de celle de [1]),  $q_1 = q^2$ ,  $q_2 = q$  et :

$$0 = u_{1,aq^{-2}}(V_{2,a}) \neq u_{2,aq}(V_{1,a}) = 1$$

On ne peut pas traiter tous les opérateurs simultanément, mais on peut cependant les interpréter individuellement en posant pour chaque  $i \in I$  :

$$\begin{aligned} d_i(m_1, m_2) &= \sum_{a \in \mathbb{C}^*} (v_{i,aq_i}(m_1) u_{i,a}(m_2) + w_{i,aq_i}(m_1) v_{i,a}(m_2)) + \sum_{a \in \mathbb{C}^*} (u_{i,aq_i} - w_{i,aq_i} + v_{i,a} + v_{i,aq_i^2})(m_1) v_{i,a}(m_2) \\ &= \sum_{a \in \mathbb{C}^*} (u_{i,aq_i}(m_1) v_{i,a}(m_2) + v_{i,aq_i}(m_1) w_{i,a}(m_2)) + \sum_{a \in \mathbb{C}^*} v_{i,aq_i}(m_1) (u_{i,a} - w_{i,a} + v_{i,aq_i^{-1}} + v_{i,aq_i})(m_2) \end{aligned}$$

Il découle alors de la définition :

**Lemme 9.** Pour tout  $m \in \hat{A}$  :

$$d_i(V_{i,aq_i}, m) = u_{i,a}(m) \text{ et } d_i(m, V_{i,aq_i}) = u_{i,aq_i^2}(m)$$

On note  $*_i$  la loi sur  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  associée au bicaratère  $d_i$ . On montre alors de la même manière que dans le cas ADE :

**Proposition 6.** Le sous  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  module  $\hat{F}_{t,i}$  de  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$  est en fait un sous-module à gauche pour la loi  $*_i$  :

$$\hat{F}_{t,i} = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} \hat{\mathcal{Y}}_t *_i (V_{i,aq} \cdot S_{i,aq^2} - t^2 S_{i,a})$$

et même un sous-bimodule  $\hat{\mathcal{Y}}_t *_i \hat{F}_{t,i} = \hat{F}_{t,i} *_i \hat{\mathcal{Y}} = \hat{F}_{t,i}$ .

L'application  $\hat{S}_{t,i}$  est une dérivation pour le produit  $*_i$ .

**4.4. Démonstration du théorème 2.** On retourne au cas général pour  $\mathfrak{g}$  simple quelconque.

**Théorème 2.** On a  $\hat{\mathfrak{K}}_{t,i} = \text{Ker}(\hat{S}_{t,i})$ .

*Démonstration:*

La première inclusion  $\hat{\mathfrak{K}}_{t,i} \subset \text{Ker}(\hat{S}_{t,i})$  est déjà connue dans la proposition 3.

Supposons par l'absurde qu'on n'ait pas égalité. Alors on considère un  $x \in \text{Ker}(\hat{S}_{t,i}) - \hat{\mathfrak{K}}_{t,i}$  qu'on décompose en utilisant le lemme 1 sur  $\hat{\mathcal{Y}}_t = \hat{\mathfrak{K}}_{t,i} \oplus \bigoplus_{m \in \hat{A} - \hat{B}_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]m$  sous la forme  $x = v + u$  avec  $u \neq 0$ . On note l'écriture de  $u$  :

$$u = \sum_{m \in M} \lambda_m m$$

avec  $M \subset \hat{A} - \hat{B}_i$ ,  $\lambda_m \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  et  $\lambda_m \neq 0$  pour  $m \in M$ . Alors  $x, v \in \text{Ker}(\hat{S}_{t,i})$ , donc  $u$  est un élément non nul de  $\bigoplus_{m \in \hat{A} - \hat{B}_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]m \cap \text{Ker}(\hat{S}_{t,i})$ . Pour  $m \in \hat{A} - \hat{B}_i$ , notons  $N_m$  le nombre de classe  $R \in \mathbb{C}^*/q^{2\mathbb{Z}}$

tel qu'il existe  $a \in R$  vérifiant  $u_{i,a}(m) < 0$ . Tous les monômes  $m$  de  $\hat{A} - \hat{B}_i$  vérifient  $N_m \geq 1$ . Soit  $m_0 \in M$  avec  $N_{m_0}$  minimal parmi les  $N_m$  pour  $m \in M$ . Soit alors  $a \in \mathbb{C}^*$  tel que  $u_{i,a}(m_0) < 0$  et pour  $r < 0$ ,  $u_{i,aq^{2r}}(m_0) \geq 0$ . Lorsqu'on calcule

$$\hat{S}_{t,i}(u) = 0 = \sum_{m \in M} \lambda_m m \left( \sum_{b \in \mathbb{C}^*/u_{i,b}(m) \geq 0} (1+t^2+\dots+t^{2(u_{i,b}(m)-1)}) S_{i,b} - \sum_{b \in \mathbb{C}^*/u_{i,b}(m) < 0} (t^{-2}+\dots+t^{2u_{i,b}(m)}) S_{i,b} \right)$$

on voit apparaître le terme  $-\lambda_{m_0} m_0 (t^{-2} + \dots + t^{2u_{i,a}(m)}) S_{i,a}$ . Ce terme doit être annulé par projection sur  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}$ . Les termes qui vont l'annuler peuvent provenir soit d'un  $S_{i,aq_i^{2r}}$  avec  $r < 0$ , soit d'un  $S_{i,aq_i^{2r}}$  avec  $r > 0$ . Dans le premier cas on a un monôme  $m_1 \in M$  tel que  $m_1 V_{i,aq_i^{-1}} V_{i,aq_i^{-3}} \dots V_{i,aq_i^{2r+1}} = m_0$ , dans le deuxième on a un monôme  $m_1 = m_0 V_{i,aq_i} \dots V_{i,aq_i^{2r-1}} \in M$ . On peut ainsi définir une suite de monômes  $m_p$  tant que  $u_{i,a}(m_p) < 0$ . Les termes de la suite sont distincts deux à deux, car à chaque opération soit on ajoute des  $V_{i,aq_i^{2r+1}}$  avec  $r \geq 0$ , soit on enlève des  $V_{i,aq_i^{2r+1}}$  avec  $r < 0$ . Notons aussi qu'à chaque opération on ne diminue pas les  $u_{i,aq_i^{2r}}$  avec  $r < 0$ , et on n'augmente pas  $N$ . Comme  $M$  est fini, la suite se termine sur un  $m_P \in M$  qui vérifie  $u_{i,aq_i^{2r}}(m_P) \geq 0$  pour  $r \leq 0$ , et  $N_{m_P} = N_{m_0}$ . En notant  $m^0 = m_0$  et  $m^1 = m_P$ , ce nouveau procédé donne une suite  $m^j$  telle que  $\min\{r/u_{i,aq_i^{2r}} < 0\}$  est strictement croissante. Par finitude de  $M$ , la suite se termine sur un  $m^{P'} \in M$  tel que  $u_{i,aq_i^{2r}} \geq 0$  pour tout  $r \in \mathbb{Z}$  et les autres classes de  $\mathbb{C}^*/q_i^{2\mathbb{Z}}$  n'ont pas été modifiées. Donc  $N_{m^{P'}} < N_{m_0}$ , contradiction.  $\square$

## 5. OPÉRATEURS D'ÉCRANTAGE POUR L'ANNEAU $\mathcal{Y}_t$

### 5.1. Rappels et compléments.

5.1.1. *L'anneau  $\mathcal{Y}_t$ .* En suivant Nakajima [4], [5] on considère l'anneau "intermédiaire" entre  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  et  $\mathcal{Y}$  :

$$\mathcal{Y}_t = \mathbb{Z}[t, t^{-1}, Y_{i,a}, Y_{i,a}^{-1}]_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*}$$

On a un morphisme d'anneaux canonique :

$$\begin{aligned} \Pi_t : \mathcal{Y}_t &\rightarrow \mathcal{Y} \\ Y_{i,a}^\pm &\mapsto Y_{i,a}^\pm \text{ et } t \mapsto 1 \end{aligned}$$

Pour passer de  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  à  $\mathcal{Y}$ , on peut considérer pour tout bicaractère  $d$  l'application  $\hat{\Pi}_d : \hat{\mathcal{Y}}_t \rightarrow \mathcal{Y}_t$  qui est  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -linéaire, et qui vérifie :

$$m = \prod_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} V_{i,a}^{v_{i,a}(m)} W_{i,a}^{w_{i,a}(m)} \mapsto t^{-d(m,m)} \prod_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} Y_{i,a}^{u_{i,a}(m)} \text{ et } t \mapsto 1$$

On a toujours  $\tilde{\Pi}_t = \Pi_t \circ \hat{\Pi}_d$ .

Dans le cas du bicaractère trivial  $d = 0$ , on note  $\hat{\Pi}_0 = \hat{\Pi}_t$  et c'est alors un morphisme d'anneaux. Dans le cas  $ADE$ , on peut prendre  $d_N$  et on retrouve l'application  $\hat{\Pi} = \hat{\Pi}_{d_N}$  de [5].

**Lemme 10.** *Un produit  $p = \prod_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} A_{i,a}^{v_{i,a}} \in \mathcal{Y}$  avec les  $v_{i,a} \in \mathbb{Z}$  est égal à 1 si et seulement si tous les  $v_{i,a}$  sont nuls.*

*En conséquence on définit une relation d'ordre partiel sur l'ensemble  $A$  des monômes de  $\mathcal{Y}$  en posant :*

$$m \leq m' \Leftrightarrow m'/m \text{ est un monôme en } A_{i,a}^{-1}$$

*Démonstration:*

Supposons par l'absurde qu'un tel produit  $p$  peut être égal à 1 avec des  $v_{i,a} \neq 0$ . Considérons alors un  $a$  tel qu'il existe un  $i \in I$  avec  $v_{i,a} \neq 0$  mais pour  $m \in \mathbb{Z}$  strictement positif, pour  $j \in I$ ,  $v_{j,aq^m} = 0$ . Parmi ces  $i$ , on en choisit un tel que la longueur de la racine associée soit maximale. Dans  $p$ , le facteur  $Y_{i,aq_i}^{-v_{i,a}}$  doit se simplifier avec un autre facteur. Cependant par définition de  $a$  il ne peut pas venir de  $A_{i,aq_i^2}^{v_{i,aq_i^2}}$ . Il reste donc les possibilités suivantes :

il provient d'un  $A_{j,aq_i}^{v_{j,aq_i}}$  avec  $C_{i,j} = -1$ ,  $j \neq i$ . Alors  $v_{j,aq_i} \neq 0$ , contradiction.

il provient d'un  $A_{j,aq_i q^{-1}}^{v_{j,aq_i q^{-1}}}$  avec  $C_{i,j} = -2$ ,  $j \neq i$ , ce qui impose  $v_{j,aq_i q^{-1}} \neq 0$ . Comme  $C_{i,j} = -2$ , les racines associées à  $i$  et  $j$  ne sont pas de même longueur, et donc en utilisant l'hypothèse sur  $i$ , on a  $r_i > r_j \geq 1$ . Alors  $q_i q^{-1} = q$  ou  $q^2$ , donc  $v_{j,aq} \neq 0$  ou  $v_{j,aq^2} \neq 0$ , ce qui n'est pas possible d'après le choix de  $i$ .

il provient d'un  $A_{j,aq_i q^{-2}}^{v_{j,aq_i q^{-2}}}$  avec  $C_{i,j} = -3$ ,  $j \neq i$ , ce qui impose  $v_{j,aq_i q^{-2}} \neq 0$ . On est dans le cas où  $\mathfrak{g}$  est de type  $G_2$ . Les racines associées à  $i$  et  $j$  ne sont pas de même longueur, et  $r_i/r_j = 3$  ou  $\frac{1}{3}$ . Si  $r_i = 3$ , on a  $v_{j,aq} \neq 0$  ce qui est contraire au choix de  $i$ . Si  $r_i = 1$ , on a  $v_{j,aq^{-1}} \neq 0$  et  $v_{j,aq^m} = 0$  pour  $m \geq 0$ . Mais alors on ne peut pas annuler  $Y_{j,aq^{-1}q_j}^{v_{j,aq^{-1}}} = Y_{j,aq^2}^{v_{j,aq^2}}$ .

Pour que  $\leq$  soit bien une relation d'ordre, la propriété la moins évidente est l'antisymétrie qui est assurée par ce qui précède.  $\square$

5.1.2. *Quelques notations.* On note  $A$  l'ensemble des monômes de  $\mathcal{Y}$ ,  $B_i \subset A$  l'ensemble des monômes  $i$ -dominants de  $\mathcal{Y}$ . Pour  $\prod_{a \in \mathbb{C}^*, j} Y_{j,a}^{u_{j,a}} = m \in B_i$ , on pose :

$$E_{0,i}(m) = m \prod_{a \in \mathbb{C}^*} \sum_{r_a=0..u_{i,a}} t^{r_a(u_{i,a}-r_a)} \begin{bmatrix} u_{i,a} \\ r_a \end{bmatrix}_t A_{i,aq_i}^{-r_a}$$

Remarquer que si de plus  $m \in B_i \cap \hat{\Pi}_t(\hat{B}_i) = B'_i$ , on a, en posant  $m = \hat{\Pi}_t(m')$ , l'égalité  $E_{0,i}(m) = \hat{\Pi}_t(E_i(m'))$ .

On note  $\mathfrak{K}_i$  le  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -module engendré par les  $E_{0,i}(m)$  avec  $m \in B_i$ . On a  $\hat{\Pi}_t(\hat{\mathfrak{K}}_i) \subset \mathfrak{K}_i$  mais on n'a pas égalité dans le cas général.

Pour  $i \in I$ , on obtient de la même manière que dans le lemme 1 une décomposition en somme directe de  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -modules :

**Lemme 11.**

$$\mathcal{Y}_t = \mathfrak{K}_{t,i} \oplus \bigoplus_{m \in A-B_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]m = \left( \bigoplus_{m \in B_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]E_{i,0}(m) \right) \oplus \left( \bigoplus_{m \in A-B_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]m \right)$$

**Lemme 12.** On a l'égalité :

$$\hat{\Pi}_t(\hat{\mathfrak{K}}_t) = \bigcap_{i \in I} \mathfrak{K}_{t,i}$$

et on notera  $\mathfrak{K}_t$  cette sous-partie de  $\mathcal{Y}_t$ .

*Démonstration:*

On sait déjà :

$$\hat{\Pi}_t(\hat{\mathfrak{K}}_t) = \hat{\Pi}_t\left(\bigcap_{i \in I} \hat{\mathfrak{K}}_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} \hat{\Pi}_t(\hat{\mathfrak{K}}_i) \subset \bigcap_{i \in I} \mathfrak{K}_i$$

Considérons à présent  $x \in \bigcap_{i \in I} \mathfrak{K}_i$ . Soit  $m \in A$  un monôme maximal parmi ceux qui interviennent dans  $x$  pour la relation d'ordre  $\leq$  du lemme 10. Pour chaque  $i \in I$ ,  $m$  provient d'un certain  $E_{0,i}(m')$  avec  $m'$   $i$ -dominant, ce qui impose  $m \leq m'$ . On a donc  $m = m'$  et  $m$  est  $i$ -dominant pour tout  $i \in I$ . Il est donc de la forme :

$$m = \prod_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} Y_{i,a}^{u_{i,a}(m)} = \hat{\Pi}_t\left(\prod_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} W_{i,a}^{u_{i,a}(m)}\right) \in \hat{\Pi}_t(\hat{\mathcal{Y}}_t)$$

car les  $u_{i,a}(m) \geq 0$ . Si on suppose  $m \neq 1$  (soit  $x \notin \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ ) et on considère  $i_0 \in I$  tel que  $wt_{i_0}(m) \neq 0$ , on a dans l'écriture de  $x$  dans  $\mathfrak{K}_{i_0}$  le monôme  $m$  qui ne peut provenir que de

$$E_{0,i_0}(m) = \hat{\Pi}_t\left(E_{i_0}\left(\prod_{i \in I, a \in \mathbb{C}^*} W_{i,a}^{u_{i,a}(m)}\right)\right) \in \hat{\Pi}_t(\hat{\mathfrak{K}}_t)$$

On peut alors enlever de  $x$  le terme  $E_{0,i_0}(m)$  avec son coefficient de  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ , et on se ramène à un élément de  $\bigcap_{i \in I} \mathfrak{K}_{t,i}$  faisant intervenir strictement moins de monôme, ce qui permet de conclure par récurrence.  $\square$

Pour définir les  $E'_{0,i}(m)$  analogues des  $E_{0,i}(m)$  relatifs à  $\hat{\Pi}$ , on considère pour  $i \in I$  en suivant [4] :

$$\phi_i : \mathfrak{K}_{t,i} \rightarrow \mathcal{Y}_t$$

définie comme l'application  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -linéaire telle que pour  $m \in B_i$  :

$$E_{0,i}(m) = \sum \lambda_M(t)M \mapsto \sum \lambda_M(t)t^{-\alpha(m,M)}M$$

avec pour  $M = m \prod_{a \in \mathbb{C}^*} A_{i,a}^{-r_a}$  ( $r_a \geq 0$ ) qui intervient effectivement dans  $E_{0,i}(m)$  :

$$\alpha(m, M) = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} r_a (u_{i, aq_i^{-1}}(m) + u_{i, aq_i}(m) - r_a - r_{aq_i^{-2}})$$

On pose alors pour  $m \in B_i$  :

$$E'_{0,i}(m) = \phi_i(E_{0,i}(m))$$

Cette définition est motivée par le lemme :

**Lemme 13.** Soit, dans le cas ADE,  $m \in B'_i$ . On a, si  $m = \hat{\Pi}_t(m')$ , l'égalité :

$$E'_{0,i}(m) = t^{-d(m', m')} \hat{\Pi}(E_i(m'))$$

*Démonstration:*

Il suffit de calculer en notant  $E_i(m') = \sum \lambda_M(t)M$  avec  $M = m' \prod_{a \in \mathbb{C}^*} V_{i,a}^{r_{a,M}}$  :

$$\hat{\Pi}(E_i(m')) = \hat{\Pi}(\sum \lambda_M(t)M) = \sum \lambda_M(t)t^{-d(M,M)}m \prod_{a \in \mathbb{C}^*} A_{i,a}^{-r_{a,M}}$$

puis :

$$\begin{aligned} d(M, M) &= d(m', m') + \sum_{a \in \mathbb{C}^*} r_{a,M} (d(V_{i,a}, m') + d(m', V_{i,a}) + d(V_{i,a}, M/m')) \\ &= d(m', m') + \sum_{a \in \mathbb{C}^*} r_{a,M} (u_{i,aq_i^{-1}}(m') + u_{i,aq_i}(m') - r_{a,M} - r_{aq_i^{-2}, M}) = d(m', m') + \alpha(m, \hat{\Pi}_t(M)) \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\hat{\Pi}(E_i(m')) = t^{-d(m', m')} \phi_i(\hat{\Pi}_t(E_i(m'))) = t^{-d(m', m')} \phi_i(E_{0,i}(m))$$

□

On note alors  $\mathcal{R}'_i$  le  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -module engendré par les  $E_{0,i}(m)$  avec  $m \in B_i$ .

Pour  $i \in I$ , on obtient de la même manière que dans le lemme 1 une décomposition en somme directe de  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -modules :

$$\mathcal{Y}_t = \mathcal{R}'_{t,i} \oplus \bigoplus_{m \in A-B_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]m = \left( \bigoplus_{m \in B_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]E'_{i,0}(m) \right) \oplus \left( \bigoplus_{m \in A-B_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]m \right)$$

Dans le cas *ADE*, on a  $\hat{\Pi}(\hat{\mathcal{R}}_i) \subset \mathcal{R}'_i$  mais on n'a pas égalité dans le cas général. On a cependant l'égalité suivante comme dans le lemme 12 :

$$\hat{\Pi}(\hat{\mathcal{R}}_t) = \bigcap_{i \in I} \mathcal{R}'_{t,i}$$

et on notera  $\mathcal{R}'_t$  cette sous-partie de  $\mathcal{Y}_t$ .

## 5.2. Les opérateurs $S^l_{t,i}$ .

5.2.1. *Définition.* On considère les  $\mathcal{Y}_t$ -modules libres :

$$\mathcal{Y}^l_{t,i} = \bigoplus_{a \in \mathbb{C}^*} \mathcal{Y}_t \cdot S_{i,a}$$

On déduit respectivement de  $\hat{\Pi}_t$ ,  $\hat{\Pi}$  (dans le cas *ADE*),  $\Pi_t$  des applications  $\hat{\Pi}^l_{t,i}$ ,  $\hat{\Pi}^l_i$ ,  $\Pi^l_{t,i}$ .

On note  $S^l_{t,i}$  l'application  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -linéaire  $S^l_{t,i} : \mathcal{Y}_t \rightarrow \mathcal{Y}^l_{t,i}$  qui prend sur un monôme  $m \in \mathcal{Y}_t$  la valeur :

$$S^l_{t,i}(m) = m \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a}(m) \geq 0} (1 + \dots + t^{2(u_{i,a}(m)-1)}) S_{i,a} - \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a}(m) < 0} (t^{-2} + \dots + t^{2u_{i,a}(m)}) S_{i,a} \right)$$

On voit immédiatement :

$$S^l_{t,i}(Y_{j,a}) = \delta_{j,i} Y_{i,a} S_{i,a} \text{ et } S^l_{t,i}(Y_{j,a}^{-1}) = -\delta_{j,i} t^{-2} Y_{i,a}^{-1} S_{i,a}$$

**Lemme 14.** *Le diagramme (1) suivant est commutatif :*

$$\begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{Y}}_t & \xrightarrow{\hat{S}^l_{t,i}} & \hat{\mathcal{Y}}^l_{t,i} \\ \hat{\Pi}_t \downarrow & & \downarrow \hat{\Pi}^l_{t,i} \\ \mathcal{Y}_t & \xrightarrow{S^l_{t,i}} & \mathcal{Y}^l_{t,i} \\ \Pi_t \downarrow & & \downarrow \Pi^l_{t,i} \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{S^l_i} & \mathcal{Y}^l_{1,i} \end{array}$$

Dans le cas *ADE*, le diagramme (1)' obtenu en utilisant respectivement  $\hat{\Pi}$ ,  $\hat{\Pi}^l_i$  à la place de  $\hat{\Pi}_t$ ,  $\hat{\Pi}^l_{t,i}$  est commutatif également.



*Démonstration:*

Toutes les applications sont  $\mathbb{Z}$ -linéaires, il suffit donc de regarder un monôme  $m \in \hat{\mathcal{Y}}_t$  et  $\lambda \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  :

$$\begin{aligned}
& (\hat{\Pi}_{t,i}^l \circ \hat{S}_{t,i}^l)(\lambda m) \\
&= \lambda \hat{\Pi}_{t,i}^l(m) \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} \geq 0} (1 + \dots + t^{2(u_{i,a}-1)}) S_{i,a} - \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} < 0} (t^{-2} + \dots + t^{2u_{i,a}}) S_{i,a} \right) \\
&= \lambda \hat{\Pi}_t(m) \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} \geq 0} (1 + \dots + t^{2(u_{i,a}-1)}) S_{i,a} - \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} < 0} (t^{-2} + \dots + t^{2u_{i,a}}) S_{i,a} \right) \\
&= \lambda \prod_{a \in \mathbb{C}^*} Y_{i,a}^{u_{i,a}} \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} \geq 0} (1 + \dots + t^{2(u_{i,a}-1)}) S_{i,a} - \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} < 0} (t^{-2} + \dots + t^{2u_{i,a}}) S_{i,a} \right) \\
&= S_{t,i}^l(\lambda \prod_{a \in \mathbb{C}^*} Y_{i,a}^{u_{i,a}}) \\
&= S_{t,i}^l(\hat{\Pi}_t(\lambda m))
\end{aligned}$$

puis un monôme  $m \in \mathcal{Y}_t$  et  $\lambda(t) \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  :

$$\begin{aligned}
& (\Pi_{t,i}^l \circ S_{t,i}^l)(\lambda(t)m) \\
&= \lambda(1) \Pi_{t,i}^l(m) \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} \geq 0} (1 + \dots + t^{2(u_{i,a}-1)}) S_{i,a} - \sum_{a \in \mathbb{C}^* / u_{i,a} < 0} (t^{-2} + \dots + t^{2u_{i,a}}) S_{i,a} \right) \\
&= \lambda(1)m \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^*} u_{i,a} S_{i,a} \right) \\
&= S_i^l(\lambda(1)m) \\
&= S_i^l(\hat{\Pi}_t(\lambda(t)m))
\end{aligned}$$

Le diagramme (1)' se traite de manière analogue.  $\square$

### 5.2.2. Interprétation des $S_i^l$ en terme de dérivation.

**Lemme 15.** *Il existe sur  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$  une unique structure de bimodule pour la multiplication usuelle . de  $\mathcal{Y}_t$  telle la structure à gauche soit la structure ci-dessus, et que pour tout  $a \in \mathbb{C}^*$  et tout monôme  $\prod_{a \in \mathbb{C}^*, j \in I} Y_{j,a}^{u_{j,a}} = m \in \mathcal{Y}_t$  :*

$$S_{i,a} \cdot m = t^{2u_{i,a}(m)} m \cdot S_{i,a}, \quad S_{i,a} \cdot t = t \cdot S_{i,a}$$

La démonstration est complètement analogue au cas  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$ .

Notons qu'on a alors pour tout  $a \in \mathbb{C}^*$  :

$$S_{i,a} \cdot Y_{i,a} = t^2 Y_{i,a} \cdot S_{i,a}, \quad S_{i,a} \cdot Y_{i,a}^{-1} = t^{-2} Y_{i,a}^{-1} \cdot S_{i,a}$$

**Proposition 7.** *L'application  $S_{t,i}^l$  a une propriété de dérivation :*

$$\forall U, V \in \hat{\mathcal{Y}}_t, \hat{S}_{t,i}^l(U \cdot V) = U \cdot \hat{S}_{t,i}^l(V) + \hat{S}_{t,i}^l(U) \cdot V$$

*C'est de plus l'unique dérivation  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -linéaire telle que  $S_{t,i}^l(Y_a) = Y_a \cdot S_a$ .*

La démonstration est complètement analogue au cas  $\hat{S}_{t,i}^l$ .

### 5.3. t-analogues des opérateurs d'écrantage pour $\mathcal{Y}_t$ .

5.3.1. *Définition des opérateurs  $S_{t,i}$ .* On considère le sous  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -module  $\hat{\Pi}_{t,i}^l(\hat{F}_{t,i})$  de  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$ .

**Lemme 16.** *Les éléments de  $\hat{\Pi}_{t,i}^l(\hat{F}_{t,i})$  sont les éléments de  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$  de la forme :*

$$\sum_{a \in \mathbb{C}^*, m \in \hat{\Pi}_t(\hat{A})} \lambda_{m,a} m(A_{t,aq_i}^{-1} t^{2u_{i,aq_i}(m)} S_{i,aq_i} - t^2 S_{i,a})$$

avec les  $\lambda_{m,a} \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  presque tous nuls.

*Démonstration:*

Le résultat découle du fait que  $\hat{\Pi}_t$  est un morphisme d'anneaux qui conserve les quantités  $u_{i,a}$ .  $\square$

Soit à présent :

$$F_{t,i} = \sum_{a \in \mathbb{C}^*, m \in A} \mathbb{Z}[t, t^{-1}] \cdot m (A_{i,aq_i}^{-1} t^{2u_{i,aq_i}^2(m)} S_{i,aq_i^2} - t^2 S_{i,a})$$

C'est un sous  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -module de  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$  qui contient  $\hat{\Pi}_{t,i}^l(\hat{F}_{t,i})$ .

Notons que les éléments de  $F_{t,i}$  sont les éléments de  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$  de la forme :

$$\sum_{a \in \mathbb{C}^*} (A_{i,aq_i}^{-1} S_{i,aq_i^2} \cdot U_a - t^2 U_a \cdot S_{i,a})$$

avec les  $U_a \in \mathcal{Y}_t$ .

**Définition 3.** On appelle  $\mathcal{Y}_{t,i}$  le  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -module quotient de  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$  par  $F_{t,i}$ , et  $S_{t,i}$  l'application obtenue à partir de  $S_{t,i}^l$  par projection sur  $\mathcal{Y}_{t,i}$ .

Notons que  $F_{t,i}$  n'est pas un  $\mathcal{Y}_t$ -sous module de  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$ , mais c'est une partie de  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$  stable par multiplication par des éléments de  $\mathbb{Z}[Y_{j,a}^\pm]_{j \neq i}$ . En particulier on peut définir une multiplication à gauche sur  $\mathcal{Y}_{t,i}$  par les éléments de  $\mathbb{Z}[Y_{j,a}^\pm]_{j \neq i}$ , qui commute avec la projection  $p_i$  de  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$  sur  $\mathcal{Y}_{t,i}$ .

**Lemme 17.** Les applications  $\Pi_{t,i}^l, \hat{\Pi}_{t,i}^l$  donnent naturellement des applications  $\Pi_{t,i}, \hat{\Pi}_{t,i}$  rendant le diagramme (2) suivant commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Y}_{t,i}^l & \longrightarrow & \hat{\mathcal{Y}}_{1,i,t} \\ \hat{\Pi}_{t,i}^l \downarrow & & \downarrow \hat{\Pi}_{t,i} \\ \mathcal{Y}_{t,i}^l & \longrightarrow & \mathcal{Y}_{t,i} \\ \Pi_{t,i}^l \downarrow & & \downarrow \Pi_{t,i} \\ \mathcal{Y}_i^l & \longrightarrow & \mathcal{Y}_i \end{array}$$

*Démonstration:*

Il suffit de vérifier que les applications  $\mathbb{Z}$ -linéaires  $\Pi_{t,i}^l, \hat{\Pi}_{t,i}^l$  passent aux quotient. Or  $\hat{\Pi}_{t,i}^l(\hat{F}_{t,i}) \subset F_{t,i}$ , donc  $\hat{\Pi}_{t,i}$  est bien définie. Puis pour  $x \in F_{t,i}$ , on a avec les notations déjà utilisées :

$$\Pi_{t,i}(x) = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} U_a(1)(A_{i,aq_i}^{-1} S_{i,aq_i^2} - S_{i,a}) \in F_i$$

$\square$

**Proposition 8.** On a le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{Y}}_t & \xrightarrow{\hat{S}_{t,i}} & \hat{\mathcal{Y}}_{t,i} \\ \hat{\Pi}_t \downarrow & & \downarrow \hat{\Pi}_{t,i} \\ \mathcal{Y}_t & \xrightarrow{S_{t,i}} & \mathcal{Y}_{t,i} \\ \Pi_t \downarrow & & \downarrow \Pi_{t,i} \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{S_i} & \mathcal{Y}_i \end{array}$$

et on a :

$$\hat{\mathfrak{R}}_{t,i} \subset \text{Ker}(S_{t,i})$$

*Démonstration:*

La commutativité du diagramme provient de la commutativité des diagrammes (1) et (2).

Puis  $\hat{\Pi}_{t,i} \circ \hat{S}_{t,i} = S_{t,i} \circ \hat{\Pi}_t$  et  $\hat{\mathfrak{R}}_{t,i} \subset \text{Ker}(\hat{S}_{t,i})$  implique  $\hat{\Pi}_t(\hat{\mathfrak{R}}_{t,i}) \subset \text{Ker}(S_{t,i})$ .

Soit alors  $m \in B_i$  qu'on décompose  $m = m_i \prod_{j \neq i} m_j$  avec les  $m_j \in \mathbb{Z}[Y_{j,a}^{\pm}]_{a \in \mathbb{C}^*}$ . Alors :

$$E_{0,i}(m) = E_{0,i}(m_i) \prod_{j \neq i} m_j$$

et comme pour tout  $a \in \mathbb{C}^*$ ,  $u_{i,a}(\prod_{j \neq i} m_j) = 0$ , on a :

$$S_{t,i}^l(E_{0,i}(m)) = (\prod_{j \neq i} m_j) S_{t,i}^l(E_{0,i}(m_i))$$

Alors pour la multiplication à gauche sur  $\mathcal{Y}_{t,i}$  par des éléments de  $\mathbb{Z}[Y_{j,a}^{\pm}]_{j \neq i}$ , on a :

$$S_{t,i}(E_{0,i}(m)) = (\prod_{j \neq i} m_j) S_{t,i}(E_{0,i}(m_i))$$

Mais alors comme  $m$  est  $i$ -dominant, on a :

$$m_i = \prod_{a \in \mathbb{C}^*} Y_{i,a}^{u_{i,a}} = \hat{\Pi}_t(\prod_{a \in \mathbb{C}^*} W_{i,a}^{u_{i,a}})$$

avec les  $u_{i,a} = u_{i,a}(m_i) \geq 0$ . En conséquence :

$$E_{0,i}(m_i) = \hat{\Pi}_t(E_i(\prod_{a \in \mathbb{C}^*} W_{i,a}^{u_{i,a}})) \in \hat{\Pi}_t(\hat{\mathfrak{K}}_{t,i}) \subset \text{Ker}(S_{t,i})$$

□

5.3.2. *Remarques sur les opérateurs  $S_{t,i}^l$ .* On peut faire une contraction analogue relative à  $\mathfrak{R}'$  en considérant les :

$$F_{t,i}' = \sum_{a \in \mathbb{C}^*, m \in A} \mathbb{Z}[t, t^{-1}] \cdot m(A_{i,aq_i}^{-1} t^{u_{i,aq_i^2}(m) - u_{i,a}(m)} S_{i,aq_i^2} - t S_{i,a})$$

puis  $\mathcal{Y}'_{t,i} = \mathcal{Y}_{t,i}^l / F_{t,i}'$ , et  $S_{t,i}'$  la composée de  $S_{t,i}^l$  avec la projection de  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$  sur  $\mathcal{Y}'_{t,i}$ .

Dans le cas  $ADE$ , on a  $\hat{\Pi}_{t,i}^l(\hat{F}_{t,i}') \subset F_{t,i}'$ , le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} \hat{\mathcal{Y}}_t & \xrightarrow{\hat{S}_{t,i}} & \hat{\mathcal{Y}}_{t,i} & & \\ \hat{\Pi}_t \downarrow & & \downarrow & \hat{\Pi}_i & \\ \mathcal{Y}_t & \xrightarrow{S_{t,i}'} & \mathcal{Y}'_{t,i} & & \\ \Pi_t \downarrow & & \downarrow & \Pi'_{t,i} & \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{S_i} & \mathcal{Y}_i & & \end{array}$$

et on a :

$$\mathfrak{R}'_{t,i} \subset \text{Ker}(S_{t,i}')$$

#### 5.4. Noyau des $t$ -opérateurs d'écrantage $S_{t,i}$ .

**Théorème 3.** *On a  $\mathfrak{K}_{t,i} = \text{Ker}(S_{t,i})$ .*

On pourrait montrer ce résultat de la même manière que  $\hat{\mathfrak{K}}_{t,i} = \text{Ker}(\hat{S}_{t,i})$  en utilisant la décomposition de  $\mathcal{Y}_t$  du lemme 1. Cette méthode permet aussi retrouver le résultat du théorème 1 en utilisant la décomposition de  $\mathcal{Y}$  :

$$\mathcal{Y} = \mathfrak{K}_i \oplus \bigoplus_{m \in A-B_i} \mathbb{Z}m$$

On propose ici une alternative qui déduit le résultat du théorème 3 de celui du théorème 1. Elle nécessite quelques lemmes préliminaires.

Noter que tout ce qui suit peut être appliqué de manière analogue à  $S_{t,i}'$  dans le cas  $ADE$ , ce qui donne  $\mathfrak{R}'_{t,i} = \text{Ker}(S_{t,i}')$ .

## 5.4.1. Lemmes préliminaires.

**Lemme 18.** *Tout  $u \in \mathcal{Y}_t$  s'écrit de manière unique sous la forme :*

$$u = \sum_{m \in D} (t-1)^{p(m)} t^{-q(m)} (\alpha_0(m) + \alpha_1(m)(t-1) + \alpha_2(m)(t-1)^2 + \dots) m$$

avec  $D \subset A$ , les  $p(m), q(m), \alpha_0(m), \alpha_1(m), \dots \in \mathbb{N}$  et  $\alpha_0(m) \neq 0$ .

*Démonstration:*

On décompose  $u$  sur la somme directe  $\mathcal{Y}_t = \sum_{m \in A} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]m$ , et il suffit donc de considérer un polynôme de Laurent  $P \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  non nul et de montrer qu'il s'écrit de manière unique :

$$P = \frac{(t-1)^{p(m)}}{t^{q(m)}} (\alpha_0(m) + \alpha_1(m)(t-1) + \alpha_2(m)(t-1)^2 + \dots)$$

Si  $P \in \mathbb{Z}[t]$ , c'est le cas car on a une base graduée  $((t-1)^p)_p$  de  $\mathbb{Z}[t]$ . Dans le cas général,  $P$  s'écrit de manière unique  $P = t^{-q(m)}Q$  avec  $Q \in \mathbb{Z}[t]$  et  $q(m) \in \mathbb{N}$ .  $\square$

**Corollaire 1.** *Le noyau de  $\Pi_t$  est  $\text{Ker}(\Pi_t) = (t-1)\mathcal{Y}_t$ .*

*Démonstration:*

L'inclusion  $(t-1)\mathcal{Y}_t \subset \text{Ker}(\Pi_t)$  est claire, puis si  $u \in \text{Ker}(\Pi_t)$ , en utilisant la décomposition du lemme 18, on voit que :

$$\sum_{m \in D, p(m)=0} \alpha_0(m)m = 0$$

or comme les  $\alpha_0(m)$  sont non nuls, pour  $m \in D$  on a  $p(m) > 0$ .  $\square$

**Lemme 19.** *Si  $\alpha \in \mathcal{Y}_{t,i}^l$  vérifie  $(t-1)\alpha \in F_{t,i}$  alors  $\alpha \in F_{t,i}$ .*

*Démonstration:*

Pour un tel  $\alpha \in \mathcal{Y}_{t,i}^l$ , on peut écrire :

$$(t-1)\alpha = \sum_{a \in \mathbb{C}^*, m \in A} \lambda_{m,a} m (A_{i,aq_i}^{-1} t^{2u_{i,aq_i^2}(m)} S_{i,aq_i^2} - t^2 S_{i,a})$$

avec les  $\lambda_{m,a} \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$  presque tous nuls. Mais si on évalue cette expression à  $t = 1$ , on trouve dans  $\mathcal{Y}_{1,i}^l$  :

$$0 = \sum_{a \in \mathbb{C}^*, m \in A} \lambda_m(1) m (A_{i,aq_i}^{-1} S_{i,aq_i^2} - S_{i,a}) = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} U_a(1) (A_{i,aq_i}^{-1} S_{i,aq_i^2} - S_{i,a})$$

avec :

$$U_a = \sum_{m \in A} \lambda_{m,a} m$$

Supposons alors par l'absurde qu'il existe un  $a$  tel que  $U_a(1) \neq 0$ . On considère alors la plus grande puissance de  $q$  tel que  $U_{aq^m}(1) \neq 0$  (qui existe car les  $U_b$  sont presque tous nuls). Alors  $A_{i,aq^{m+1}}^{-1} U_{aq^m}(1)$  est le coefficient de  $S_{i,aq_i^2}$ , donc  $A_{i,aq^{m+1}}^{-1} U_{aq^m}(1) = 0$ , contradiction. On peut donc écrire tous les  $U_a$  sous la forme  $U_a = (t-1)U'_a$  avec les  $U'_a = \sum_{m \in A} \lambda'_{m,a} m \in \mathcal{Y}_t$ , et  $(t-1)\alpha = (t-1)\beta$  avec :

$$\beta = \sum_{a \in \mathbb{C}^*, m \in A} \lambda_{m,a} m (t^{2u_{i,aq_i^2}(m)} A_{i,aq_i}^{-1} S_{i,aq_i^2} - t^2 S_{i,a}) \in F_{t,i}$$

Mais comme  $\mathcal{Y}_{t,1}^l$  est un  $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -module libre, on a  $\alpha = \beta$ .  $\square$

5.4.2. *Démonstration du théorème 3. Démonstration:*

La première inclusion  $\mathfrak{K}_{t,i} \subset \text{Ker}(S_{t,i})$  est déjà connue.

Considérons  $u \in \text{Ker}(S_{t,i})$ . Alors  $0 = \Pi_{t,i}(S_{t,i}(u)) = S_i(\Pi_t(u))$  et donc d'après le théorème 1,  $\Pi_t(u) \in \mathbb{Z}[Y_{j,b}^{\pm}]_{j \neq i, b \in \mathbb{C}^*} \mathbb{Z}[Y_{i,a}(1 + A_{i,aq_i}^{-1})]_{a \in \mathbb{C}^*}$ , soit :

$$\Pi_t(u) = \sum_m \lambda_m \prod_{a \in \mathbb{C}^*} (Y_{i,a}(1 + A_{i,aq_i}^{-1}))^{p_a(m)}$$

avec  $\lambda_m \in \mathbb{Z}[Y_{j,b}^{\pm}]_{j \neq i, b \in \mathbb{C}^*}$  et les  $p_a(m) \geq 0$ . Pour chaque  $m$ , on pose :

$$v_m = \prod_{a \in \mathbb{C}^*} (W_{i,a}(1 + V_{i,aq_i}^{-1}))^{*p_a(m)} = E_i(\prod_{a \in \mathbb{C}^*} W_{i,a}^{p_a(m)}) \in \hat{\mathfrak{K}}_{t,i}$$

En considérant alors :

$$v = \sum_m \lambda_m \hat{\Pi}_t(v_m)$$

on a  $v \in \hat{\mathfrak{K}}_{t,i}$  et  $\Pi_t(v) = \Pi_t(u)$ , donc  $v - u \in \text{Ker}(\Pi_t) = (t-1)\mathcal{Y}_t$  d'après le corollaire 1. En conséquence :

$$u = v + (t-1)u_1$$

avec  $u_1 \in \mathcal{Y}_t$ . Mais alors  $(t-1)u_1 \in \text{Ker}(S_{t,i})$ , soit  $(t-1)S_{t,i}^l(u_1) \in F_{t,i}$ . Alors d'après le lemme 19,  $S_{t,i}^l(u_1) \in F_{t,i}$ , soit  $u_1 \in \text{Ker}(S_{t,i})$ . On peut recommencer avec  $u_1$ , et on obtient par récurrence que pour tout  $p \in \mathbb{N}$ , il existe  $w_p \in \hat{\mathfrak{K}}_{t,i}$  et  $u_p \in \text{Ker}(S_{t,i})$  tels que :

$$u = w_p + (t-1)^p z_p$$

Décomposons  $u = b + c$  sur la somme directe du lemme 11 :

$$\mathcal{Y}_t = \hat{\mathfrak{K}}_{t,i} \oplus \bigoplus_{m \in \hat{A}-\hat{B}_i} \mathbb{Z}[t, t^{-1}]m$$

et supposons par l'absurde que  $c \neq 0$ . Pour  $p$ , prenons  $p_0 = p(m_0) + 1$  avec  $p(m_0)$  le plus grand  $p(m)$  qui apparait dans la décomposition de  $c$  du lemme 18. On obtient une écriture  $u = w + (t-1)^{p_0}v$ . Décomposons  $v = b' + c'$  sur la somme directe du lemme 1. Alors :

$$u = b + c = w + (t-1)^{p_0}b' + (t-1)^{p_0}c'$$

et  $b = w + (t-1)^{p_0}b'$  et  $c = (t-1)^{p_0}c'$ . Donc les  $p(m)$  qui apparaissent dans la décomposition de  $c$  du lemme 18 sont tous strictement plus grands que  $p_0$ , contradiction. On a donc  $\hat{\mathfrak{K}}_{t,i} = \text{Ker}(S_{t,i})$ .  $\square$

6. COMPLÉMENTS RELATIFS AUX INVOLUTIONS

On rappelle les involutions définies par Nakajima : sur  $\mathcal{Y}_t$  on pose  $\bar{t} = t^{-1}$ ,  $\overline{Y_{i,a}^{\pm}} = Y_{i,a}^{\pm}$ , et sur  $\hat{\mathcal{Y}}_t$  pour  $d$  un bicaratère, on pose :

$$\bar{t} = t^{-1}, \quad \overline{m} = t^{2d(m,m)}m$$

En particulier dans le cas  $ADE$  on a l'involution obtenue avec  $d_N$ . Elle est alors anti multiplicative relativement à  $*$  et commute avec  $\hat{\Pi}$ .

On étend ces involutions à  $\mathcal{Y}_{t,i}^l$  (respectivement à  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}^l$ ) en posant  $\overline{S_{i,a}} = t^{-2}S_{i,a}$ , soit :

$$\overline{\sum_{a \in \mathbb{C}^*} U_a S_{i,a}} = \sum_{a \in \mathbb{C}^*} t^{-2} S_{i,a} \overline{U_a}$$

pour des  $U_a$  dans  $\mathcal{Y}_t$  (respectivement  $\hat{\mathcal{Y}}_t$ ).

**Lemme 20.** *On a pour  $x \in \hat{\mathcal{Y}}_t, y \in \mathcal{Y}_t$  :*

$$\overline{S_{t,i}^l(x)} = S_{t,i}^l(\bar{x}), \quad \overline{\hat{S}_{t,i}^l(y)} = \hat{S}_{t,i}^l(\bar{y})$$

*De plus  $\hat{F}_{t,i}, F_{t,i}^l$  sont stables par les involutions correspondantes.*

*Démonstration:*

Les deux résultats s'obtiennent de manière analogue, en considérant par exemple un monôme  $a \in \mathcal{Y}_t$  :

$$\begin{aligned}
& \overline{S_{t,i}^l(\lambda(t)m)} \\
&= \lambda(t^{-1}) \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^* u_{i,a}(m) \geq 0} (1 + t^{-2} + \dots + t^{-2(u_{i,a}(m)-1)}) t^{-2} S_{i,a} m \right. \\
&\quad \left. + \sum_{a \in \mathbb{C}^* u_{i,a}(m) < 0} (t^2 + \dots + t^{-2u_{i,a}(m)}) t^{-2} S_{i,a} m \right) \\
&= \lambda(t^{-1}) m \left( \sum_{a \in \mathbb{C}^* u_{i,a}(m) \geq 0} (t^{2(u_{i,a}(m)-1)} + \dots + t^2 + 1) S_{i,a} + \sum_{a \in \mathbb{C}^* u_{i,a}(m) < 0} (t^{2u_{i,a}(m)} + \dots + t^{-2}) S_{i,a} \right) \\
&= \lambda(t^{-1}) S_{t,i}^l(m) = \overline{S_{t,i}^l(\lambda(t)m)}
\end{aligned}$$

Considérons ensuite, par exemple dans le cas *ADE* :

$$\begin{aligned}
& \overline{\lambda(t)m(V_{i,aq_i} t^{2u_{i,aq_i^2}(m)} S_{i,aq_i^2} - t^2 S_{i,a})} \\
&= \lambda(t^{-1}) t^{-2} (t^{-2u_{i,aq_i^2}(m)} S_{i,aq_i^2} t^{2d(m,m)-2+2u_{i,a}(m)+2u_{i,aq_i^2}(m)} m V_{i,aq_i} - t^{-2} S_{i,a} t^{2d(m,m)} m) \\
&= \lambda(t^{-1}) t^{-2+2d(m,m)} m (V_{i,aq_i} t^{-2} S_{i,aq_i^2} t^{-2+2u_{i,a}(m)+2u_{i,aq_i^2}(m)} - t^{-2+2u_{i,a}(m)} S_{i,a}) \\
&= \lambda(t^{-1}) t^{-6+2d(m,m)+2u_{i,a}(m)} m (V_{i,aq_i} S_{i,aq_i^2} t^{2u_{i,aq_i^2}(m)} - t^2 S_{i,a}) \in \hat{F}_{t,i}
\end{aligned}$$

et dans le cas général :

$$\begin{aligned}
& \overline{\lambda(t)m(A_{i,aq_i}^{-1} t^{u_{i,aq_i^2}(m)-u_{i,a}(m)} S_{i,aq_i^2} - t S_{i,a})} \\
&= \lambda(t^{-1}) t^{-2} (t^{u_{i,a}(m)-u_{i,aq_i^2}(m)} S_{i,aq_i^2} m A_{i,aq_i}^{-1} - t^{-1} S_{i,a} m) \\
&= \lambda(t^{-1}) t^{-2} m (A_{i,aq_i}^{-1} t^{-2+u_{i,aq_i^2}(m)+u_{i,a}(m)} S_{i,aq_i^2} - t^{-1+2u_{i,a}(m)} S_{i,a}) \\
&= \lambda(t^{-1}) t^{-4+2u_{i,a}(m)} m (A_{i,aq_i}^{-1} t^{u_{i,aq_i^2}(m)-u_{i,a}(m)} S_{i,aq_i^2} - t S_{i,a}) \in F'_{t,i}
\end{aligned}$$

□

On peut ainsi définir des involutions sur  $\hat{\mathcal{Y}}_{t,i}, \mathcal{Y}'_{t,i}$  qui commutent respectivement avec les opérateurs d'écrantage associés.

**Remerciements :** Je remercie M. Rosso pour nos discussions et ses précieux conseils, et H. Nakajima pour ses indications sur les  $q, t$ -caractères.

#### RÉFÉRENCES

- [1] **N. Bourbaki**, *Groupes et algèbres de Lie* Chapitres IV-VI, Hermann (1968)
- [2] **E. Frenkel et N. Reshetikhin**, *The  $q$ -Characters of Representations of Quantum Affine Algebras and Deformations of  $W$ -Algebras*  
<http://www.arxiv.org/abs/math/9810055>  
 Recent Developments in Quantum Affine Algebras and related topics, Cont. Math., vol 248, pp 163-205 (1999)
- [3] **E. Frenkel et E. Mukhin**, *Combinatorics of  $q$ -Characters of Finite-Dimensional Representations of Quantum Affine Algebras*  
<http://www.arxiv.org/abs/math/9911112>  
 Comm. in Math. Phys., vol 216, no. 1, pp 23-57 (2001)
- [4] **H. Nakajima**,  *$t$ -Analogue of the  $q$ -Characters of Finite Dimensional Representations of Quantum Affine Algebras*  
<http://www.arxiv.org/abs/math/0009231>  
 "Physics and Combinatorics", Proc. Nagoya 2000 International Workshop, World Scientific, pp 181-212 (2001)
- [5] **H. Nakajima**, *Quiver Varieties and  $t$ -Analogues of  $q$ -Characters of Quantum Affine Algebras*  
<http://www.arxiv.org/abs/math/0105173>
- [6] **M. Rosso**, *Représentations des groupes quantiques*  
 Séminaire Bourbaki exp. no. 744, Astérisque 201-203, 443-83, SMF (1992)

DAVID HERNANDEZ: ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE - DMA, 45, RUE D'ULM F-75230 PARIS, CEDEX 05 FRANCE

*E-mail address:* David.Hernandez@ens.fr, URL: <http://www.dma.ens.fr/~dhernand>