

Fonctions holomorphes de la variable p

1

Lours n°2 Tessier
Jen Bo Corriveau
Printemps 2014
Lours n°2

Hypotheses: Fq Corps fini

E Corps local de Corps résiduel \mathbb{F}_q  $E = \mathbb{F}_q((\pi))$
 π uniformisante de E
 (tout ce qu'on fait ne dépend pas de ce choix)

$F|_{F_q}$ valeur complét " : $F \rightarrow \mathbb{R}_+$ (non triviale)
 parfait " $q^{-v(\cdot)}$

\sim pas discrete !

$$\text{Ex.: } \left\{ \begin{array}{l} F = b_s(\overbrace{\pi^{1/\Gamma^0}}) \\ F = \widehat{b_s}(\pi) \end{array} \right. = b(\pi) \text{ parfait}$$

$$(\pi(\Gamma)) = \left\{ f = \sum_{\alpha \in P} a_\alpha \pi^\alpha \mid \begin{array}{l} a_\alpha \in \mathbb{C} \\ \text{supp}(f) \text{ bien ordonné} \end{array} \right\}$$

→ cf. Poenaru "Maximally Complete fields".

Le Corps \mathcal{E}

Def. \mathcal{E}/E unique extension non-ramifiée complète de corps résiduel F/\mathbb{F}_q .

$$\text{i.e. } \mathcal{E} = \mathcal{O}_{\mathcal{E}}\left[\frac{1}{n}\right]$$

$\mathcal{O}_{\mathcal{E}} = \mathcal{O}_E$ - algèbre π -adique plate

$$\mathcal{O}_{\mathcal{E}}/\pi \mathcal{O}_{\mathcal{E}} = F.$$

Il existe un unique relèvement

Multiplicatif

$$[xy] = [x] \cdot [y]$$

$$[-]: F \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{E}}$$

$$[x] = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\widehat{x^{q^m}} \right)^{q^{-m}}$$

↑ relèvement
quelconque de $x^{q^{-m}}$.

Tout élément de \mathcal{E} s'écrit de façon unique

$$\sum_{m>-\infty} [x_m] \pi^m, \quad x_m \in F.$$

Réponse culturelle:

$$K/\mathbb{F}_q - K = \varprojlim_{\text{filtrante}} \mathbb{F}_q\text{-alg. lisses}$$

$$\Rightarrow L_K/\mathbb{F}_q \sim \mathcal{D}_K^1/\mathbb{F}_q$$

$\chi^{-1}(L_K/\mathbb{F}_q) = 0 \Rightarrow$ il existe un relèvement π -adique plat \mathcal{O}_L , $\mathcal{O}_L/\pi = K$

$\chi^{-1}(L_K/\mathbb{F}_q) > 0 \Rightarrow$ deux tels relèvements
anti-isomorphes.
 \mathcal{O} = anneau de Cohen.

Mais si $\mathcal{D}_K^1/\mathbb{F}_q \neq 0$ il n'y a pas de relèvement unique

$$\text{Ici } F \text{ parfait} \Rightarrow \mathcal{D}_F/\mathbb{F}_q = 0$$

\Rightarrow relèvement unique à l'iso. Unique près.

(2)

2 Cas: $E = F_q((\pi)) \Rightarrow E$ est additif i.e. $F \hookrightarrow E$

$$\mathcal{O}_E = F[[\pi]]$$

$$E = F((\pi))$$

$$* E|_{Q_p} \quad \mathcal{O}_E = W_{G_E}(F) = W(F) \otimes_{G_{E_0}} \mathcal{O}_{E_0} \quad E|_{E_0} = W(F_q)|_Q$$

extension max. N.R.

$$\sum_{m \geq 0} [x_m] \pi^m + \sum_{m \geq 0} [y_m] \pi^m = \sum_{m \geq 0} [P_m(x_0, \dots, x_m, y_0, \dots, y_m)] \pi^m$$

$$P_m \in F_q[X_0^{1/p^\infty}, \dots, X_m^{1/p^\infty}, Y_0^{1/p^\infty}, \dots, Y_m^{1/p^\infty}]$$

Idem pour la multiplication.

$$E_n: E = Q_p - \quad P_0 = X_0 + Y_0$$

$$P_1 = X_1 + Y_1 + S(X_0^{1/p}, Y_0^{1/p})$$

$$S(X, Y) = \frac{(X+Y)^p - X^p - Y^p}{p}$$

L'anneau B^b :

$$\boxed{\text{Def. } B^b = \left\{ \sum_{m \geq -\infty} [x_m] \pi^m \in E \mid \sup_m |x_m| < \infty \right\}}$$

(la topologie de F)
intervient

$$A = \left\{ \sum_{m \geq 0} [x_m] \pi^m \in E \mid x_m \in Q_F \right\}$$

Ainsi notation classique.

Ex: * $E = \mathbb{F}_q(\pi)$ avec un relèvement $\tilde{\pi}$ du constat précédent
en faisant $\beta = \pi$.

$$* A = \begin{cases} \mathbb{Q}_F[\pi] \\ W_{\mathbb{Q}_E}(G_F) \end{cases}$$

On a $B^h = A\left[\frac{1}{\pi}\right] \frac{1}{[\omega_F]}$ $0 < |\omega_F| < 1$

Norme de Gauss: Def: $\rho \in]0, 1[$, $\rho = q^{-n}$, $n \in [0, +\infty[$
 $x = \sum_m [x_m] \pi^m \in B^h$

$$\|x\|_\rho := \sup_{m \in \mathbb{Z}} |x_m| \rho^m$$

$$\left[q^{-v_n(x)} \text{ ou } v_n(x) = \inf_{m \in \mathbb{Z}} \{v(x_m) + m\rho\} \right]$$

Rem: * lorsque $\rho \neq 1$ la borne sup précédente est toujours atteinte
pas le cas pour $\|.\|_1$

$$* \lim_{\rho \rightarrow 1^-} \|x\|_\rho = \|x\|_1$$

$$* \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n(x)}{n} = v_\pi(x) = \text{ord}_\pi(x)$$

3

$$\text{Def: } \|\cdot\|_0 = q^{-\sqrt{n}}$$

Prop: $\forall p \in [0,1]$, $\|\cdot\|_p$ norme multiplicative sur B^b
 i.e. $\forall n \in [0,+\infty]$, n est une valuation.

dém: * $|x_1| = \lim_{p \rightarrow 1} |x_1|_p \Rightarrow$ il suffit de traiter le cas $p \in]0,1[$

$$* |\pi^b [\bar{\omega}_F^l] x|_p = p^b |\bar{\omega}_F|^l \cdot |x|_p \text{ et } B^b = A \left[\frac{1}{\pi}, \frac{1}{\bar{\omega}_F} \right]$$

\Rightarrow il suffit de tout montrer pour la restriction
 de $\|\cdot\|_p$ à A .

Lemme: Pour $x = \sum_{m \geq 0} [n_m] \pi^m \in A$ et $b \in \mathbb{N}$ notons

$$Nb(x) = \sup_{0 \leq i \leq b} |x_i|.$$

(1) $\forall b$, Nb ne dépend pas du choix de π

$$(2) |x|_p = \sup_{b \geq 0} Nb(x) p^b$$

$$(3) Nb(xy) \leq \sup \{ Nb(x) + Nb(y) \}$$

$$(4) Nb(xy) \leq \sup_{i+j=b} N_i(x) N_j(y)$$

Preuve: (1) Si $a \in \mathcal{O}_F$, $Nb(a) \leq |a| \Leftrightarrow a \in \underbrace{A[a] + \pi^{b+1} A}_{\text{idéal indépendant du}} A$

choix de π .

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \sup_{b \geq 0} N_b(k) p^b &= \sup_{b \geq 0} \sup_{0 \leq i \leq b} |k_i| p^b \\
 &= \sup_{i \geq 0} \sup_{b \geq i} |k_i| p^b \\
 &= \|k\|_p \quad \underbrace{|x_i|_p \text{ car } p \in [0, 1]}_{\text{car}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad N_b(|a|) &= |a| \quad a, b \in \mathbb{Q}_F \\
 N_b(y) &= |b| \quad y \in ([a], \pi^{b+1}) \quad (\text{idem pour } A) \\
 y &\in ([b], \pi^{b+1}) \\
 \Rightarrow a+y &\in ([a], [b], \pi^{b+1}) \subset ([c], \pi^{b+1}) \\
 \text{Si } |c| &= \sup \{|a|, |b|\} \\
 \Rightarrow N_b(a+y) &\leq \sup \{N_b(a), N_b(b)\}.
 \end{aligned}$$

$$(4) \left(\sum_{i \geq 0} [x_i] \pi^i \right) \left(\sum_{j \geq 0} [y_j] \pi^j \right) = \sum_{i+j \leq b} [x_i y_j] \pi^{i+j} \bmod \pi^{b+1}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Si } \sum_{i+j \leq b} \sigma_F x_i y_j &= \sigma_F a \text{ alors} \quad \in ([a], \pi^{b+1}) \\
 |a| &= \sup_{i+j \leq b} N_i(a) N_j(y).
 \end{aligned}$$

* Le lemme $\Rightarrow \|.\|_p$ norme triv. mult. indépendante de π .

Reste à montrer la multiplicativité.

(4)

$$x = \sum_{n \geq 0} [x_n] \pi^n$$

$$m_0 = \inf \{m \mid |x_m| \rho^m = |x|_\rho\}$$

$$y = \sum_{m \geq 0} [y_m] \pi^m$$

$$m_0 = \inf \{m \mid |y_m| \rho^m = |y|_\rho\}$$

Posons $\|\cdot\| = N_{m_0 + m_0}(\cdot) \rho^{m_0 + m_0}$ = semi-norme sur A .

$$\|\cdot\| \leq \|\cdot\|_\rho.$$

$$x = \underbrace{\sum_{n=0}^{m_0-1} [x_n] \pi^n}_{x'} + [x_{m_0}] \pi^{m_0} + \underbrace{\sum_{n>m_0} [x_n] \pi^n}_{x''}, \quad \|x'\|_\rho < |x|_\rho$$

$$y = y' + [y_{m_0}] \pi^{m_0} + y'', \quad \|y'\|_\rho < |y|_\rho$$

$$xy \equiv x'y + y'x + [x_{m_0} y_{m_0}] \pi^{m_0 + m_0} \pmod{\pi^{m_0 + m_0 + 1}}$$

$$\|x'y + y'x\|_\rho \leq \sup \{ \|x'\|_\rho |y|_\rho, |y'|_\rho |x|_\rho \} < |x|_\rho |y|_\rho.$$

$$\|[x_{m_0} y_{m_0}] \pi^{m_0 + m_0}\| = |x|_\rho |y|_\rho$$

$$\Rightarrow \|xy\| = |x|_\rho |y|_\rho \Rightarrow |xy|_\rho \geq |x|_\rho |y|_\rho$$

□

Rem: Si $p \in [0, 1]$, $\|\cdot\|_p|_E$ = unique w.a. définissant la topologie de E telle que $\|1\|_p = p$.

* Si $p=1$, $\|\cdot\|_1|_E$ = valeur absolue triviale - Topologie triviale = topologie discrète.

Def.: $I \subset [0, 1]$ Intervalle - $B_I = \text{Complét de } B / ((I, \rho)_{\rho \in I})$

$$B := B_{[0, 1]}.$$

Ex: * $E = \mathbb{F}_q((\pi))$ $I \subset]0, 1[\Rightarrow B_I = \mathcal{O}(\mathbb{D}_{F, I})$

Couronne rigide analytique
de la variable π sur F

Mais B_I est une comme E -algèbre et non une F -algèbre.

- $B_{\{0\}} = \text{complét de } B^r$ pour $v_{\pi} = \Sigma$

- $B_{\{1\}} = \left\{ \sum_{m \in \mathbb{Z}} x_m \pi^m \mid \lim_{m \rightarrow -\infty} x_m = 0 \text{ et } \sup_m |x_m| < \infty \right\}$

↳ pas d'interprétation géométrique

- Si $I \neq \{0\}, \{1\}$ $B_I = \left\{ f \in G(\mathbb{D}_{F, I, \{0, 1\}}) \mid \begin{array}{l} \text{f méromorphe} \\ \text{en } 0 \text{ si } 0 \in I \\ |f|_1 < \infty \text{ si } 1 \in I \end{array} \right\}$

Théorème

* $B_I = \begin{cases} E\text{-algèbre de Fréchet si } 1 \notin I \\ E^{\text{dis}}\text{-algèbre de Fréchet si } 1 \in I \end{cases}$

Cas I Compact

* Si $I = [\rho_1, \rho_2] \subset]0, 1]$, $\lambda \in B^b$, $n \mapsto v_n(\lambda)$ concave

\Rightarrow atteint sa borne inf au sein d'un intervalle
 $-\log I$

$\Rightarrow \forall p \in I, \| \cdot \|_p \leq \sup \{ \| \cdot \|_{\rho_1}, \| \cdot \|_{\rho_2} \}$

$\Rightarrow B_I = \begin{cases} E_{alg. cl. Banach} si 1 \notin I \\ E^{disc. alg. cl. Banach} si 1 \in I. \end{cases}$

* Si $I = [0, \rho]$ on vérifie que si $0 < \rho' \leq \rho$ et $\lambda \in B^b$

alors $|\lambda|_0 \leq 1 \Rightarrow |\lambda|_{\rho'} \leq |\lambda|_{\rho}$

\Rightarrow la topologie de B_I est définie par $\sup \{ \| \cdot \|_0, \| \cdot \|_{\rho} \}$

$\Rightarrow B_I = \text{Banach.}$

En général, $B_I = \varprojlim_{\substack{J \subset I \\ \text{Compact}}} B_J = \varprojlim \text{alg. de Banach.}$

Topologie induite sur A : $A = \left\{ \lambda \in B^b \mid \sup_{p \in [0, 1]} |\lambda|_p \leq 1 \right\}$

Def: Topologie faible de A = topologie produit via

$$\begin{aligned} G_F^{\mathbb{N}} &\xrightarrow{\sim} A \\ (x_m)_{m \geq 0} &\mapsto \sum_{m \geq 0} [x_m] \pi^m \end{aligned}$$

- = topologie de la C.V. Simple des Coeff. de Teichmüller
- = topologie $([\infty_F], \pi)$ -adique
- = Complet.

$\forall p \in]0, 1[$, topologie induite par H_p sur A = topologie faible

$p=0 \rightarrow$ b.f. π -adique

$p=1 \rightarrow$ b.f. $[\infty_F]$ -adique

[Ex: A Complet $\Rightarrow B_{[0,1]} = B^b$ et $B_{[0,1]}^o = A$.]

$$\left. \begin{array}{l} \forall i \in [0, 1] \\ A \subset B_i \\ \text{fermé} \end{array} \right\} \Rightarrow A \subset B_I$$

Rélm: * Si $E \in \mathbb{Q}_p$ pas de bonne notion de fonction holomorphe de la variable

π pour des rayons ≥ 1 :

$\left\{ \sum_{m \geq 0} [x_m] \pi^m / \lim_{m \rightarrow \infty} x_m = 0 \right\}$ n'est pas stable par l'addition.

Car $\left\{ \sum_{m \geq 0} [x_m] \pi^m \in E \mid x_m = 0 \text{ pour } m \gg 0 \right\}$ pas stable par l'addition

* Si $E \in \mathbb{Q}_p$ la topologie induite par H_1 sur A n'est pas la topologie de la C.V.

Uniforme des Coeff. de Teichmüller: $\forall \epsilon \in m_F$, $\left| \frac{1}{(1+\epsilon)^{-1}} - 1 \right|_1 = 1$

⑥

$$\Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} |[z+\varepsilon]_1 - 1|_1 \neq |[z]_1 - 1|_1 = 0.$$

$[E]: G_F \rightarrow A$ pas l° pour H_1

alors que c'est clairement le cas si $E = F_q((t))$.

Polygones de Newton

Problème: Si $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ vérifie $\forall p \in]0, 1[\quad \lim_{|n| \rightarrow +\infty} |\lambda_n| p^n = 0$

alors $\sum_{m \in \mathbb{Z}} [\lambda_m] \pi^m$ C.V. dans B . Mais si $E \models Q_p$:

- * On ne sait pas si tout élément de B possède un tel développement "en série de Laurent" de cette forme là.
- * Sur ces éléments on ne sait pas si une telle écriture est unique (quasi-sûr faux)
- * On ne sait pas si le produit ou la somme de deux tels éléments est de cette forme là.

Solution: transformée de Legendre inverse

Prop: $\forall x \in B$ non nul. $\exists_{n \rightarrow \infty} k, k_n \in B^b$.

Alors, $\forall K$ compact de $]0, +\infty[$ $\exists N, n \geq N \Rightarrow \forall x \in K, v_n(x) = v_n(k_n)$.

~~Déf.~~ \rightarrow Déf: $\varphi_n:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ suite de fonctions concaves qui convergent uniformément vers φ . Alors, la CV est uniforme sur tout compact de $]0, +\infty[$.

Corollaire: $\forall x \in B$ non nul, $\forall K$ compact de $]0, +\infty[$ il existe $y \in B^b$

tel que $\forall r \in K, v_n(y) = v_n(y)$
 \Rightarrow la fonction concave $\begin{cases}]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ r \mapsto v_n(r) \end{cases}$ est un polygone concave à pentes entières.

[Def: Pour $x \in B$ on note $\text{Newt}(x)$ la transformée de Legendre

l'inverse de $r \mapsto v_r(x)$

= polygones à abscisses de rayons entières (décroissant)

[Prop: $\text{Newt}(xy) = \text{Newt}(x) * \text{Newt}(y)$]

\rightarrow Conséquence de $v_r(xy) = v_r(x) + v_r(y)$

\Rightarrow pentes de $\text{Newt}(xy)$ obtenues par concaténation des pentes de $\text{Newt}(x)$ et $\text{Newt}(y)$.

Rem: Bien sûr si $x = \sum_{n \geq -\infty} [k_n] q^n \in B^b$

7

$\text{Neut}(x) = \text{enveloppe convexe de } \{(n, v(k_n))\}_{n \in \mathbb{Z}}$.

$$\text{En: } \text{Neut}\left(\frac{v(a_1)}{q} (q - [a_1]) - (q - [a_1])\right) = \overbrace{\text{...}}^{x = v(a_1)} \rightarrow x = v(a_1) \geq \dots \geq v(a_2) > 0$$


Polygone de Neutre des éléments de B_I , I quelconque

Problème: ~~Trouver~~ $I \subset [0, 1]$ intervalle, $k + B_I$ non nul.

On admettra définir $\text{Neut}_I(x) = \text{polygone dont les pentes}$
 $\in -\log_q(I \setminus \{0\}) \subset [0, +\infty[$.

de telle manière que si $x \in B^b$, $\text{Neut}_I(x) = \text{Neut}(x) \cup \text{pentes } \lambda \in q^{-\lambda} \notin I\}$.

Si $I = q^{-n} \{$ et $k \in B^b$, $v_n(x)$ ne détermine pas complètement $\text{Neut}_I(x)$



Solution: Tous $(v_n(x), 2g v_n(x), 2g v_n(x))$ le déterminent complètement.

Les valeurs de rang 2

$$x \mapsto \begin{cases} (v_n(x), 2g v_n(x)) \\ (v_n(x), -2g v_n(x)) \end{cases}$$

clément des

Spécifications de v_n elles se prolongent à B_I lorsque $q^{-n} \notin I$.

$\Rightarrow \forall x \in B_I \setminus \{0\}, q^{-n} \in I$ on peut définir $\mathcal{I}_{q^n}(x), \mathcal{J}_{q^n}(x) \in \mathbb{Z}$ si $n \neq 0$.
 $\mathcal{E}_{q^n}(x) = 0$.

Prop: $x \in B_I$, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$, $x_n \in B^b$. Alors, $\forall K$ compact de $-\log(I \setminus \{0\}) \subset [0, +\infty]$.

Il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$,

~~$$\begin{aligned} q^{-n} &\in I \\ q^{-n} &= \frac{x_n}{x} \\ q^{-n} &= \frac{\mathcal{I}_{q^n}(x_n)}{\mathcal{I}_{q^n}(x)} \\ q^{-n} &= \frac{\mathcal{J}_{q^n}(x_n)}{\mathcal{J}_{q^n}(x)} \end{aligned}$$~~

$$q^{-n} \in I \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{I}_{q^n}(x_n) = \mathcal{I}_{q^n}(x) \\ \mathcal{J}_{q^n}(x_n) = \mathcal{J}_{q^n}(x) \\ \mathcal{I}_{q^n}(x_n) = \mathcal{J}_{q^n}(x) \text{ si } n \neq 0. \end{cases}$$

$\Rightarrow \forall J \subset I \setminus \{0\}$ compact, $(\text{Neut}_J(x_n))_{n \geq 0}$ est constant pour $n \gg 0$.

On pose alors $\text{Neut}_I(x) = \lim_{\substack{J \subset I \setminus \{0\} \\ \text{Compact}}} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Neut}_J(x_n) \right)$

Ne dépend pas du choix de la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de B^b tendant vers x .

* On a encore $\text{Neut}_I(xy) = \text{Concaténé de } \text{Neut}_I(x) \text{ et } \text{Neut}_I(y)$.

⑧

Frobenius

$$\varphi: \mathcal{E} \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}$$

$$\sum_m [k_m] \pi^m \mapsto \sum_m [k_m^q] \pi^m$$

Envoie B^h dans lui-même.

$\varphi = \text{Frob. arithmétique}$

De plus $|\varphi(x)|_p = |x|_{p^{2h}}^q$. Notons pour $f \in \mathbb{F}_{[0,1]}$, $\varphi(f) = f^q$.

Alors, φ s'élargit par \mathbb{F} en un isomorphisme $\varphi: B_I \xrightarrow{\sim} B_{\varphi(I)}$.

En particulier, pour $I =]0, 1[$,

B
 φ
 Automorphisme.

L'anneau B^+ : lien avec les anneaux de Fontaine

$$\begin{aligned}
 \text{Def. } B^{l,+} &= \left\{ \sum_{n>-\infty} [k_n] \pi^n \mid \forall n, |k_n| \leq 1 \right\} & B^+ &:= B_{]0, 1[}^+ \\
 &= A\left[\frac{1}{\pi}\right] = \left\{ \mathcal{O}_F[[\pi]]\left[\frac{1}{\pi}\right] \right. \\
 &\quad \left. \cup \mathcal{W}_{G_{\overline{\mathbb{F}}}}(\mathcal{O}_F)\left[\frac{1}{\pi}\right] \right\}
 \end{aligned}$$

Def: $B_I^+ =$ complété de $B^{l,+}$ relativement à $(1/p)_{p \in I}$.

\Rightarrow adhérence de $B^{l,+}$ dans B_I .

Ex. \mathbb{A} Compt $\Rightarrow B^+ = B_{[0,1]}^{b,+}$.

$$B_{[0,1]}^+ = \mathbb{A}$$

$B_{[0,1]}^+$ = bornes qui n'a pas d'interprétation géométrique si $E = \mathbb{F}_q(\mathbb{P}^1)$

$$= \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}[\mathbb{P}^1] \left[\frac{1}{a} \right]$$

\Rightarrow on va supposer que $I \neq \emptyset$ et $I \neq \mathbb{Z}$.

Lemme: $x \in B^{b,+}$ $n \geq n' > 0$. Alors

$$v_{n'}(x) \geq \frac{n'}{n} v_n(x)$$

$$\text{dem: } v_{n'}(x) = \inf_m (v(x_m) + mn') = \frac{n'}{n} \inf_m \left(\underbrace{\frac{n}{n'}}_m v(x_m) + mn \right) \geq 0$$

$$\geq \frac{n'}{n} \inf_m (v(x_m) + mn) = v_n(x) \quad \square$$

Notons alors pour $p \in J_{[0,1]}$, $B_p^+ = B_{[p,1]}^+$.

Corollaire: $B_p^+ = B_{[p,1]}^+$.

Fait: $J \subset I \Rightarrow B_I \subset B_J$

Prop: $B_p^+ = B_{[p,1]}^+$ (mais la b.p. est pas la m').

dém: $x = \sum_{m \geq 0} x_m \in B^+$ avec $x_m \in B^{b,+}$ $\lim_{m \rightarrow \infty} |x_m|_p = 0$.

Si $y = \sum_{b > -\infty} [y_b] \pi^b$ on note $y^+ = \sum_{b \geq 0} [y_b] \pi^b$ et $y^- = \sum_{b < 0} [y_b] \pi^b$

(9)

$$y = y^+ + y^- \text{ et } |y|_p = \sup \{|y^+_p|, |y^-|_p\}.$$

Remarquons de plus que $|y^-|_1 \leq |y^-|_p$.

$$\text{Ainsi, } x = \sum_{m \geq 0} (x_m^+ + x_m^-) = \underbrace{\sum_{m \geq 0} x_m^+}_{\in A \text{ car } A \text{ complet}} + \underbrace{\sum_{m \geq 0} x_m^-}_{\text{C.V. pour } \|.\|_1 \Rightarrow C_B_{[p, 1]}}$$

□

* Donc, $\forall p \in]0, 1[\cup\{\infty\}$, $B_p^+ = B_{[p, 1]}^+$.
 toute fonction + sur la norme p
 si l'ordre de croissance en l'origine
 fonction sur les bornes de
 rayon plus grand.

$$\text{* Donc, si } \alpha p' \leq p \quad B_{p'}^+ = B_{[p', 1]}^+ \subset B_{[p, 1]}^+ = B_p^+.$$

$$\text{Ainsi, } B^+ = \bigcap_{p \in]0, 1[\cup\{\infty\}} B_p^+.$$

$\varphi: B_p^+ \cong B_{p'}^+ \subset B_p^+ \Rightarrow \varphi$ (l'ordre en un endomorphisme
 de B_p^+).

$$(q \otimes q) \circ \varphi = \varphi \circ \dots$$

et $\forall p \in J_{0,1}^{\circ}$,

$$B^+ = \bigcap_{m \geq 0} \mathcal{P}^m(B_p^+)$$

= plus grande sous-anneau de B^+ sur lequel p est bijectif.

* Supposons que $p = |\alpha|$, $\alpha \in F$, où $p < 1$.

La boule unité de $B_p^{l,+}$ pour $\|\cdot\|_p = |A| \left[\frac{[\alpha]}{n} \right]$

$$\Rightarrow \cancel{B_p^+} = \overbrace{|A| \left[\frac{[\alpha]}{n} \right] \left[\frac{1}{n} \right]}^{\text{Complétion } n\text{-adique.}}$$

* Supposons que $E = \mathbb{Q}_p$. $A = W(G_E)$. Soit $p \in J_{0,1}^{\circ}$ et $\alpha_p \in G_E$ l'ideal $\{x \in \mathbb{Q} / |x| \leq p\}$.

$$A_{\text{crys},p} := H^0 \left(\left(\text{Spec}(G_E/\alpha) / \text{Spec}(x_p) \right)_{\text{crys}}, G \right)$$

\swarrow Complétion p -adique

$$= W(G_E) \left[\frac{[\alpha]^n}{n!} \right] \quad \text{si } |\alpha| = p.$$

$$B_{\text{crys},p}^+ = A_{\text{crys},p} \left[\frac{1}{r} \right].$$

$$\begin{aligned} B_{p,n}^+ &\subset B_{\text{crys},p}^+ \subset B_p^+ \\ \Rightarrow B_p^+ &= \bigcap_{m \geq 0} \mathcal{P}^m(B_{\text{crys},p}^+) \end{aligned}$$

$$B^+ = \bigcap_{n \geq 0} q^n(B_{\text{aus}, p})$$

= plus grand sous-anneau de $B_{\text{aus}, p}$ sur lequel
 q est bijectif.

Rem: $t \in B_{\text{aus}, p}$ satisfaisant $q(t) = pt$.
 $\Rightarrow (D, q) = b\text{-sociale ou } \cancel{\text{perfect}} \text{ b-COF corps parfait.}$

$$\left(D \otimes_{W(b)_Q} B_{\text{aus}, p} \left[\frac{1}{F} \right] \right) \xrightarrow{q = \text{Id}} \left(D \otimes_{W(b)_Q} B^+ \left[\frac{1}{F} \right] \right) \xrightarrow{\neq \text{Id}}$$

\Rightarrow les périodes cristallines qui à priori vivent dans $B_{\text{aus}, p} \subset B^+_p$
vivent en fait dans B^+ : elles ont un rayon de C.V. plus grand
(analogie de l'adice de Drinfeld).

