

Feuille d'exercices n°1 : Arithmétique dans \mathbb{N} et \mathbb{Z}

Écriture des nombres entiers, réels

Exercice 1 (*Bases de numération*)

1. Soit $b \geq 2$ un entier. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ il existe un unique entier $k \geq 0$ et une unique suite (a_0, \dots, a_k) avec $a_k \neq 0$, tels que :

$$n = a_0 + a_1b + \dots + a_kb^k, \quad \text{et } 0 \leq a_i < b \text{ pour } i = 0, \dots, k.$$

2. Donner l'écriture en base 16 de $n = 331$.
3. Donner un algorithme de passage de l'écriture décimale (c'est-à-dire, en base 10) d'un nombre à son écriture en base b .

Enfin, justifiez l'affirmation suivante : le nombre de "chiffres" nécessaires pour écrire un nombre entier n est proportionnel à $\log n$.

Exercice 2 (*Écriture décimale ou b -imale*) Soit $b \geq 2$ un entier et a_0, a_1, a_2, \dots une suite d'entiers avec $a_0 \in \mathbb{Z}$ et $0 \leq a_i \leq b - 1$ pour $i \geq 1$.

1. Montrer que la suite définie par

$$x_n := a_0 + \frac{a_1}{b} + \frac{a_2}{b^2} + \dots + \frac{a_n}{b^n} = \sum_{j=0}^n \frac{a_j}{b^j}$$

est croissante et convergente. Vérifier que la limite x appartient à l'intervalle $[a_0, a_0 + 1]$.

2. Inversement, si x est un réel dans l'intervalle $[a_0, a_0 + 1[$, montrer qu'il existe une suite a_1, a_2, \dots telle que $x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=0}^n \frac{a_j}{b^j} \right)$. On dit qu'on obtient ainsi le *développement b -imal* de x .
3. Considérons les deux suites a_j et a'_j telles que $a_j = a'_j$ pour $j < n_0$, mais $a_{n_0} = a'_{n_0} + 1$ et, pour $j > n_0$ on a $a_j = 0$ et $a'_j = b - 1$. Montrer que les deux suites sont associées au même nombre réel (qui est en fait un nombre rationnel de la forme A/b^{n_0}).
4. Montrer que le développement b -imal d'un nombre réel est unique, sauf dans le cas mentionné à la question précédente.

Nombres premiers et factorisation

Exercice 3

1. La différence de deux nombres est 538. Si l'on divise l'un par l'autre, le quotient est 13 et le reste 22. Quels sont ces nombres ?
2. On divise un entier positif a inférieur à 85 par un entier positif b . Le quotient est 3 et le reste est 19. Quelles sont les valeurs possibles de a et b ?

Exercice 4

1. Donner la liste des entiers positifs qui divisent 100.
2. Combien le nombre 6000000 a-t-il de diviseurs positifs ?

Exercice 5 Trouver le pgcd et le ppcm de $a = 2^3 \times 3^5 \times 7^2$ et $b = 2 \times 5^2 \times 7^3$.

Exercice 6 On veut démontrer que $\sqrt{3}$ est irrationnel. On propose les deux méthodes suivantes.

1. Supposons qu'il existe des entiers positifs a, b tels que $\sqrt{3} = a/b$. Montrer que $a/b = 3b/a = (3b - a)/(a - b)$. Vérifier que $0 < 3b - a < a$. En déduire qu'il existe deux suites (a_n) et (b_n) d'entiers positifs tels que pour tout n , $\sqrt{3} = a_n/b_n$ et $a_{n+1} < a_n$, d'où une contradiction.
2. Donner une autre preuve de l'irrationalité de $\sqrt{3}$ en décomposant a et b en produit de facteurs premiers dans l'égalité $3b^2 = a^2$. [Indication : on regardera en particulier l'exposant de 3 dans la décomposition en facteurs premiers de a et b .]

Exercice 7 Soit n un entier tel que $10 \leq n \leq 100$. Montrer que n est un nombre premier si et seulement si $\text{pgcd}(n, 210) = 1$.

Exercice 8

1. Décomposer $10!$ en produit de facteurs premiers.
2. Trouver la plus grande puissance de 2 qui divise $100!$ *Indication* : compter le nombre des multiples de 2 qui sont ≤ 100 , puis le nombre des multiples de 4, puis le nombre des multiples de 8, etc. . .
3. Trouver le nombre de zéros qui figurent à la fin de l'écriture décimale de $100!$.

Exercice 9 (Nombres de Mersenne)

1. Soient b et n des entiers supérieurs ou égaux à 2. Montrer que $b^n - 1$ est multiple de $b - 1$.
2. Soient a et k des entiers supérieurs ou égaux à 2. On suppose que $a^k - 1$ est un nombre premier. Montrer que $a = 2$ et que k est un nombre premier.
3. Soit p un nombre premier tel que $p \leq 7$. Montrer que $2^p - 1$ est un nombre premier.
4. Vérifier que 23 divise $2^{11} - 1$. Conclure que si p est un nombre premier, alors $M_p := 2^p - 1$ n'est pas nécessairement premier.

5. On définit un nombre *parfait* comme un nombre égal à la somme de ses diviseurs propres, c'est-à-dire vérifiant

$$n = \sum_{d|n, d < n} d \quad \text{ou encore} \quad 2n = \sum_{d|n} d.$$

Montrer que si $M_p = 2^p - 1$ est premier, alors le nombre $N_p = 2^{p-1}M_p$ est parfait.

6. Montrer que si n est pair et parfait alors il est de la forme N_p .¹

Exercice 10 (Nombres de Fermat)

1. Soient b et n des entiers supérieurs ou égaux à 2. Montrer que si n est impair, alors $b^n + 1$ est multiple de $b + 1$.
2. Montrer que si $2^n + 1$ est un nombre premier, alors n est une puissance de 2.
3. On pose $F_n = 2^{2^n} + 1$. Montrer que F_0, \dots, F_4 sont premiers mais que F_5 est composé (il est divisible par 641).

Exercice 11 Soit n un entier positif. Soit $a > 1$ un diviseur entier de $n! + 1$. Montrer que $a > n$. En déduire qu'il existe une infinité de nombres premiers.

Exercice 12 Soit n un entier ≥ 1 . Montrer qu'il existe n nombres entiers consécutifs qui ne sont pas premiers. *Indication* : considérez $(n + 1)! + 2, (n + 1)! + 3, \dots$

Exercice 13 Soit a et b deux entiers premiers entre eux (i.e. $\text{pgcd}(a, b) = 1$). On suppose que $ab = c^2$. Montrer que a et b sont eux-mêmes des carrés au signe près.

PGCD et théorème de Bézout

Exercice 14 Résoudre l'équation $37x + 53y = 1$ en nombres entiers.

Exercice 15 Soient a, b, c des entiers relatifs, où a et b ne sont pas tous les deux nuls. Montrer que l'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si et seulement si c est un multiple du pgcd de a et b .

Exercice 16

1. Calculer le pgcd de 637 et 595.
2. Trouver les entiers x et y tels que $637x + 595y = 91$.
3. Trouver les entiers x et y tels que $637x + 595y = 143$.

Exercice 17 Résoudre les équations suivantes en nombres entiers :

1. $283x + 1722y = 31$.
2. $365x + 72y = 18$.

1. Cette question est plus difficile (le résultat est dû à Euler) ; on ignore s'il existe un nombre parfait impair.

3. $1111x + 2345y = 66$.

Exercice 18 Soient a et b des entiers non tous les deux nuls.

1. Montrer que pour tout entier x , $\text{pgcd}(a, b + ax) = \text{pgcd}(a, b)$.
2. Montrer que si x est un entier positif, $\text{pgcd}(xa, xb) = x \text{pgcd}(a, b)$.
3. Montrer que si x est un entier positif tel que $\text{pgcd}(x, b) = 1$, alors $\text{pgcd}(ax, b) = \text{pgcd}(a, b)$.

Exercice 19

1. Soit n un entier. (a) Déterminer le pgcd de $9n + 15$ et $4n + 7$ en fonction de n .
2. Montrer que n^2 et $2n + 1$ sont premiers entre eux.