

Interrogation écrite 1

06 Octobre 2014

Durée : 40 minutes

L'usage de tout document ou appareil électronique est strictement interdit.

Exercice 1 (barème indicatif : 8 points).

- (a) Donner la définition d'une distance d sur un ensemble X .
- (b) Donner la définition d'une norme N sur un \mathbb{R} -espace vectoriel V .
- (c) Soient (X, d) un espace métrique et A une partie de X . Décrire (avec des quantificateurs) quand un point $x \in X$ appartient à l'adhérence de A .
- (d) L'ensemble \mathbb{R} est muni de la distance usuelle d définie par $d(x, y) = |x - y|$ pour tout $x, y \in \mathbb{R}$. Traduire (avec des quantificateurs) la propriété : « \mathbb{Q} est dense dans \mathbb{R} ».

Exercice 2 (barème indicatif : 10 points).

On munit le \mathbb{R} -espace vectoriel \mathbb{R}^2 de la norme euclidienne N usuelle : si $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $N(v) = \|v\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$. Notons $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > x\}$.

- (a) Dessiner E comme partie du plan euclidien standard.
- (b) E est-il ouvert ? Fermé ? Justifier par une rédaction rigoureuse.
- (c) Déterminer l'intérieur de E .
- (d) Déterminer l'adhérence de E .
- (e) Déterminer la frontière de E .
- (f) E est-il borné ? Justifier.

Exercice 3 (barème indicatif : 4 points).

Soit d_2 la distance induite par la norme deux $\|\cdot\|_2$ sur \mathbb{R}^2 .

Calculer la distance $d_2(p, E)$, où $p = (3, -1)$ et $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > x\}$ de l'exercice précédent. Justifier le calcul fait.