


Esquisse de solution de l'examen du vendredi 14 juin 2002


Problème I

1)


a) L'automate associé à la lettre  $a$  est



celui associé à  $(bc)^*$  est



et le produit cartésien de ces deux automates, qui est associé au produit de mélange  $a \amalg (bc)^*$ , est



b) Plusieurs méthodes permettent de déterminer la série génératrice des mots reconnus par cet automate. Si, pour chaque état  $p$ , on désigne par  $S_p$  la série génératrice des mots commençant à l'état initial et terminant à l'état  $p$ , alors la série cherchée est celle  $S_{2A}$  de l'état final, et il suffit de résoudre le système

$$\begin{array}{ll} S_{1A} = e + S_{1BC}, & S_{2A} = S_{1A}a + S_{2BC}, \\ S_{1B} = S_{1Ab}, & S_{2B} = S_{1B}a + S_{2Ab}, \end{array}$$

qui donne

$$\begin{aligned} S_{1A} &= (bc)^*, & S_{1B} &= (bc)^*b, & S_{2B} &= (bc)^*ba + S_{2Ab}, \\ S_{2A} &= (bc)^*a + (bc)^*bac + S_{2A}bc \end{aligned}$$

et finalement

$$S_{2A} = (bc)^*(a + bac)(bc)^*.$$

Une deuxième solution consiste à noter  $T_p$  la série génératrice des mots commençant à l'état  $p$  et terminant à l'état final, de sorte que la série cherchée est celle  $T_{1A}$  de l'état initial; il suffit alors de résoudre le système

$$\begin{aligned} T_{1A} &= aT_{2A} + bT_{1B}, & T_{2A} &= e + bT_{2B}, \\ T_{1B} &= cT_{1A} + aT_{2B}, & T_{2B} &= cT_{2A}, \end{aligned}$$

qui donne

$$\begin{aligned} T_{2A} &= (bc)^*, & T_{2B} &= c(bc)^*, & T_{1B} &= cT_{1A} + ac(bc)^*, \\ T_{1A} &= a(bc)^* + bac(bc)^* + bcT_{1A} \end{aligned}$$

et finalement

$$T_{1A} = (bc)^*(a + bac)(bc)^*.$$

On peut encore remarquer que la série des mots réussis empruntant l'arête  $\boxed{1A} \xrightarrow{a} \boxed{2A}$  est  $S_{1A}aT_{2A}$ , celle des mots réussis empruntant l'arête  $\boxed{1B} \xrightarrow{a} \boxed{2B}$  est  $S_{1A}bacT_{2A}$ , et la série reconnue par l'automate est leur somme  $S_{1A}(a + bac)T_{2A}$ .

c) On retrouve la relation  $a_{\text{III}}(bc)^* = (bc)^*(a + bac)(bc)^*$  par un calcul direct en écrivant

$$a_{\text{III}}(bc)^* = \sum_{i \geq 0} a_{\text{III}}(bc)^i$$

et

$$a_{\text{III}}(bc)^i = \sum_{j=0}^i (bc)^j a (bc)^{i-j} + \sum_{j=0}^{i-1} (bc)^j bac (bc)^{i-j-1},$$

qui donne

$$\begin{aligned} a_{\text{III}}(bc)^* &= \sum_{i \geq 0} \sum_{j=0}^i (bc)^j a (bc)^{i-j} + \sum_{i \geq 0} \sum_{j=0}^{i-1} (bc)^j bac (bc)^{i-j-1} \\ &= \sum_{j \geq 0} (bc)^j a \sum_{i \geq j} (bc)^{i-j} + \sum_{j \geq 1} (bc)^j bac \sum_{i > j} (bc)^{i-j-1} \\ &= (bc)^* a (bc)^* + (bc)^* bac (bc)^*. \end{aligned}$$

Le même calcul donne plus généralement

$$a_{\text{III}}w^* = w^*(a_{\text{III}}w)w^* + a$$

pour tout  $w \in X^*$ .

d) Dans le cas particulier  $c = a$  on trouve

$$a_{\text{III}}(ba)^* = (ba)^*(e + ba)a(ba)^*$$

Mais pour  $w \in X^*$ ,  $w \neq e$ , on a  $w^*(e - w) = e$ , donc  $w^*w = w^* - e$  et on peut encore écrire  $(ba)^*(e + ba) = 2(ba)^* - e$ .

- 2) Prenons  $a = x_1$ ,  $b = x_0$ , de sorte que  $a = y_1$  et  $ba = y_2$ . On obtient  $y_1 \amalg y_2^* = (2y_2^* - e)y_1 y_2^*$ . On développe:

$$\sum_{n \geq 0} y_1 \amalg y_2^n = \left( 2 \sum_{h \geq 0} y_2^h - e \right) y_1 \sum_{k \geq 0} y_2^k$$

On identifie, pour  $n \geq 1$ , les parties homogènes de poids  $2n + 1$  (on rappelle que pour  $s \geq 1$  le poids de  $y_s$  est  $s$ ):

$$y_1 \amalg y_2^n = 2 \sum_{h+k=n} y_2^h y_1 y_2^k - y_1 y_2^n = 2 \sum_{i=1}^n y_2^i y_1 y_2^{n-i} + y_1 y_2^n.$$

Par récurrence sur  $n$ , à partir de

$$y_1 \star y_2^n = y_1 y_2^n + y_2 (y_1 \star y_2^{n-1}) + y_3 y_2^{n-1},$$

on vérifie la relation, pour  $n \geq 1$ ,

$$y_1 \star y_2^n = \sum_{i=0}^n y_2^i y_1 y_2^{n-i} + \sum_{h=0}^{n-1} y_2^h y_3 y_2^{n-h-1}.$$

Par différence on obtient

$$y_1 \amalg y_2^n - y_1 \star y_2^n = \sum_{i=1}^n y_2^i y_1 y_2^{n-i} - \sum_{h=0}^{n-1} y_2^h y_3 y_2^{n-h-1}.$$

Comme  $y_2^n \in \mathfrak{H}^0$ , d'après la relation d'Hoffman cet élément est dans le noyau de  $\widehat{\zeta}$ . Donc

$$\sum_{i=1}^n \zeta(\{2\}_i, 1, \{2\}_{n-i}) = \sum_{h=0}^{n-1} \zeta(\{2\}_h, 3, \{2\}_{n-1-h}).$$

Par exemple

$$\zeta(2, 1) = \zeta(3), \quad \zeta(2, 1, 2) + \zeta(2, 2, 1) = \zeta(3, 2) + \zeta(2, 3),$$

$$\zeta(2, 1, 2, 2) + \zeta(2, 2, 1, 2) + \zeta(2, 2, 2, 1) = \zeta(3, 2, 2) + \zeta(2, 3, 2) + \zeta(2, 2, 3).$$

**Problème II**

Si  $P$  et  $\tilde{P}$  dans  $\mathbb{R}[T]$  vérifient

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha |na_n - P(\log n)| = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha'} |na_n - \tilde{P}(\log n)| = 0$$

avec  $\alpha > 0$  et  $\alpha' > 0$ , alors pour  $\alpha'' = \min\{\alpha, \alpha'\}$  on a encore

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha''} |P(\log n) - \tilde{P}(\log n)| = 0$$

et on en déduit facilement  $P = \tilde{P}$ . De même on vérifie facilement que  $\mathcal{E}$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et que l'application  $f \mapsto P_f$  est  $\mathbb{R}$ -linéaire.

- 1) L'idée est la suivante: quand  $P_f$  est un monôme  $x^k$ , le coefficient  $a_n$  se comporte comme  $(\log n)^k/n$  quand  $n$  est grand, donc il est naturel de comparer  $A_n$  et  $\sum_{1 \leq i \leq n} (\log i)^k/i$ . Pour voir que cette dernière somme est équivalente à

$$\frac{1}{k+1} (\log n)^{k+1} + \gamma_k$$

avec une constante  $\gamma_k$  indépendante de  $n$ , on peut soit la comparer à une intégrale, et dans ce cas le mieux est d'utiliser la formule d'Euler MacLaurin, soit effectuer une transformation d'Abel. Nous commençons par cette dernière approche.

Fixons  $k \geq 1$  et montrons que pour chaque entier  $k \geq 1$  il existe un nombre réel  $\gamma_k > 0$  tel que

$$(*) \quad \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} (\log i)^k = \frac{1}{k+1} (\log n)^{k+1} + \gamma_k + O((\log n)^k/n) \quad \text{quand } n \rightarrow \infty.$$

Que la somme porte sur  $1 \leq i \leq n-1$  ou sur  $1 \leq i \leq n$  ne change évidemment rien.

Pour  $i \geq 1$  on définit  $\beta_k(i) \in \mathbb{R}$  par  $\beta_k(1) = 0$  et

$$\frac{1}{i} (\log i)^k = \frac{(\log i)^{k+1} - (\log(i-1))^{k+1}}{k+1} + \beta_k(i) \quad \text{pour } i \geq 2.$$

Alors, pour  $n \geq 2$ ,

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} (\log i)^k = \frac{1}{k+1} (\log(n-1))^{k+1} + \sum_{i=1}^{n-1} \beta_k(i).$$

Pour estimer  $\beta_k(i)$  on écrit

$$\begin{aligned} (\log n)^{k+1} - (\log(n-1))^{k+1} &= (\log n - \log(n-1)) \sum_{i=0}^k (\log n)^i (\log(n-1))^{k-i} \\ &= \frac{k+1}{n} (\log n)^k + O((\log n)^k/n^2) \quad \text{quand } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Donc

$$|\beta_k(i)| = O((\log i)^k / i^2) \quad \text{quand } i \rightarrow \infty$$

et

$$\sum_{i \geq n} |\beta_k(i)| = O((\log n)^k / n) \quad \text{quand } n \rightarrow \infty.$$

En effet pour  $n$  suffisamment grand

$$\sum_{i \geq n} \frac{1}{i^2} (\log i)^k \leq \int_n^\infty \frac{1}{t^2} (\log t)^k dt = O((\log n)^k / n^2).$$

On en déduit la relation (\*) avec  $\gamma_k = \sum_{i \geq 1} \beta_k(i)$ .

Une autre démonstration de l'existence de  $\gamma_k$  vérifiant (\*) repose sur la formule d'Euler-MacLaurin (Dieudonné, Calcul infinitésimal, Chap. IX, § 7)

$$\sum_{k=m}^n f(k) = \int_m^n f(t) dt + \frac{1}{2}(f(m) + f(n)) + \int_m^n (t - [t] - 1/2) f'(t) dt$$

que l'on utilise avec  $m = 1$ ,  $f(t) = (\log t)^k / t$ . Comme

$$\int_1^n (\log t)^k \frac{dt}{t} = \frac{1}{k+1} (\log n)^{k+1}$$

et que

$$f'(t) = (k - \log t)(\log t)^{k-1} \frac{1}{t^2},$$

on trouve le résultat avec

$$\gamma_k = \int_1^\infty (t - [t] - 1/2)(k - \log t)(\log t)^{k-1} \frac{dt}{t^2}.$$

Soit maintenant  $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$  un élément de  $\mathcal{E}$ . Posons  $P_f(T) = \sum_{k=0}^d p_k T^k$ . On écrit, pour  $n \geq 1$ ,

$$a_n = \frac{1}{n} P_f(\log n) + \frac{\epsilon_n}{n^{\alpha+1}} = \sum_{k=0}^d p_k \frac{1}{n} (\log n)^k + \frac{\epsilon_n}{n^{\alpha+1}}$$

avec  $\epsilon_n \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow \infty$ . Alors

$$A_n = a_0 + \sum_{k=0}^d p_k \gamma_k + \sum_{k=0}^d p_k \frac{(\log n)^{k+1}}{k+1} + \sum_{i=1}^n \frac{\epsilon_i}{i^{\alpha+1}} + O((\log n)^k / n).$$

On en déduit que le polynôme

$$Q_f(t) = \sum_{k=0}^d \frac{1}{k+1} p_k T^{k+1} + q_0$$

avec

$$q_0 = a_0 + \sum_{k=0}^d p_k \gamma_k + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\epsilon_i}{i^{\alpha+1}}$$

vérifie

$$n^\beta |A_n - Q_f(\log n)| \rightarrow 0 \quad \text{quand } n \rightarrow \infty,$$

ceci pour tout  $\beta$  dans l'intervalle  $0 < \beta < \min\{1, \alpha\}$ . En particulier on a bien

$$\frac{d}{dT} Q_f = P_f.$$

L'unicité de ce polynôme  $Q_f$  et le fait que l'application  $f \mapsto Q_f$  soit  $\mathbb{R}$ -linéaire sont faciles.

2) Soit  $f \in \mathcal{E}$ .

a) Commençons par montrer que, pour  $k \geq 1$ , la fonction  $f_k = \text{Li}_{\{1\}_k}$ , à savoir

$$f_k(x) = \frac{(-1)^k}{k!} (\log(1-x))^k,$$

appartient à  $\mathcal{E}$  et que son polynôme  $P_{f_k}$  associé a pour degré  $k-1$  (en fait on anticipe sur la question 4c). On a, pour  $k \geq 1$ ,

$$f_k(x) = \sum_{n_1 > n_2 > \dots > n_k \geq 1} \frac{x^{n_1}}{n_1 \cdots n_k} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n^{(k)} x^n$$

avec  $a_0^{(k)} = 0$  et, pour  $n \geq 1$ ,

$$a_n^{(k)} = \frac{1}{n} \sum_{\substack{n_2 > n_3 > \dots > n_k \geq 1 \\ n_2 < n}} \frac{1}{n_2 \cdots n_k}.$$

Quand  $k=1$  on a  $a_n^{(1)} = 1/n$  pour tout  $n \geq 1$ , la fonction  $f_1$  appartient à  $\mathcal{E}$  et le polynôme  $P_{f_1} = 1$  est de degré 0. En notant

$$A_n^{(k)} = \sum_{m=1}^{n-1} a_m^{(k)},$$

on a pour  $k \geq 2$

$$a_n^{(k)} = \frac{1}{n} A_n^{(k-1)},$$

ce qui permet de vérifier, par récurrence, que la fonction  $f_k$  appartient à  $\mathcal{E}$  et que les polynômes  $P_{f_k}$  et  $Q_{f_k}$  qui lui sont associés sont reliés par  $P_{f_k} = Q_{f_{k-1}}$  ( $k \geq 2$ ). Par récurrence on trouve aussi que le terme de plus haut degré de  $P_{f_k}$  est  $T^{k-1}/(k-1)!$  et celui de  $Q_{f_k}$  est  $T^k/k!$ . En particulier le polynôme  $P_{f_k}$  a pour degré  $k-1$  et les  $P_{f_k}$ ,  $k \geq 1$ , forment une base de  $K[T]$ .

Pour la fonction  $f_k$  la question 2a est évidente avec

$$R_{f_k}(T) = \frac{(-1)^k}{k!} T^k.$$

Passons au cas général: pour  $f \in \mathcal{E}$  montrons qu'il existe  $\kappa \in \mathbb{R}$ ,  $\kappa > 0$  et  $R_f \in \mathbb{R}[T]$ , tels que

$$f(x) = R_f(\log(1-x)) + O((1-x)^\kappa) \quad \text{quand } x \rightarrow 1.$$

Écrivons  $P_f$  sur la base des  $P_{f_k}$ :

$$P_f = \sum_{k=1}^d \lambda_k P_{f_k}.$$

Posons  $\tilde{f} = f - \sum_{k=1}^d \lambda_k f_k$ . Alors  $P_{\tilde{f}} = 0$ . Quitte à remplacer  $f$  par  $\tilde{f}$ , on peut supposer  $P_f = 0$ . Nous allons montrer que l'hypothèse

$$n^{1+\alpha} |a_n| \rightarrow 0 \quad \text{quand } n \rightarrow \infty,$$

entraîne l'existence de  $\kappa > 0$  tel que

$$f(x) = f(1) + O((1-x)^\kappa) \quad \text{quand } x \rightarrow 1, \quad 0 < x < 1.$$

Cela montrera en même temps que si  $P_f = 0$ , alors  $R_f$  est le polynôme constant  $f(1)$ , tandis que si  $P_f \neq 0$ , si  $d$  désigne son degré et  $aT^d$  son terme de plus haut degré, alors

$$f(x) \sim \frac{(-1)^{d+1}}{d+1} a (\log(1-x))^{d+1}$$

quand  $x \rightarrow 1$ , donc  $R_f$  a pour degré  $d+1$  et pour terme de plus haut degré

$$\frac{(-1)^{d+1}}{d+1} a T^{d+1}.$$

Pour  $0 < x < 1$  on a

$$1 - x^n \leq n(1-x) \quad \text{et} \quad 1 - x^n < 1,$$

donc pour  $0 < \kappa < 1$

$$1 - x^n < (1 - x^n)^\kappa < n^\kappa (1-x)^\kappa.$$

Par conséquent pour  $0 < \kappa < \min\{1, \alpha\}$  on a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-x^n}{n^{\alpha+1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^\kappa (1-x)^\kappa}{n^{\alpha+1}} = O((1-x)^\kappa)$$

quand  $x \rightarrow 1$ ,  $0 < x < 1$ . Il est utile pour tout-à-l'heure (question 2d) de noter que cela signifie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^{\alpha+1}} = \zeta(\alpha+1) + O((1-x)^\kappa) \quad \text{quand } x \rightarrow 1, \quad 0 < x < 1.$$

Reprenons notre fonction  $f$  avec  $n^{1+\alpha}|a_n| \rightarrow 0$ . On écrit

$$|f(x) - f(1)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|(1-x^n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-x^n}{n^{\alpha+1}} + O(1-x) = O((1-x)^\kappa).$$

b) Ici encore l'unicité de  $R_f$  est facile, de même que le fait que l'application  $f \mapsto R_f$  soit linéaire.

c) On a vu dans ci-dessus que si  $P_f = 0$ , alors le polynôme  $R_f$  est constant égal à  $f(1)$ .

On a vu aussi que si  $P_f$  n'est pas nul et a pour degré  $d$ , alors  $R_f$  a pour degré  $d+1$ , et en particulier n'est pas constant.

d) Si  $Q_f$  est une constante  $c$ , alors la série  $\sum a_n$  converge vers  $c$ , ce qui entraîne (lemme d'Abel: cf Dieudonné, op. cit., p. 195) que  $f(x) \rightarrow c$  quand  $x \rightarrow 1$ ,  $0 < x < 1$ , d'où on déduit  $R_f = c$ .

Inversement, si  $R_f$  est une constante  $c$ , alors  $f(x) \rightarrow c$  quand  $x \rightarrow 1$ ,  $0 < x < 1$ . De plus, le polynôme  $R_f$  étant de degré 0, il en résulte que  $P_f$  est nul, c'est-à-dire  $a_n = O(n^{-1-\alpha})$ , ce qui permet d'écrire, pour  $0 < x < 1$ ,

$$\left| \sum_{n \geq 0} a_n - \sum_{n \geq 0} a_n x^n \right| \leq \sum_{n \geq 0} |a_n|(1-x^n) \leq \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n^{1+\alpha}}(1-x^n) \rightarrow 0$$

quand  $x \rightarrow 1$ , donc

$$\sum_{n \geq 0} a_n = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = c.$$

Ainsi pour  $c \in K$  la condition  $R_f = c$  équivaut à  $Q_f = c$ . Pour  $c = 0$  on en déduit le résultat demandé.

3) Les conditions (i) et (ii) sont équivalentes car  $P_f = (d/dT)Q_f$ . Nous avons vu aussi à la question 2c que (i) équivaut à (iii); quand ces conditions (i) et (iii) sont vérifiées on a aussi  $Q_f = R_f$ .

Que (i) implique (iv) résulte du fait que si  $P_f = 0$ , alors la série  $\sum |a_n|$  converge.

Enfin, si la série  $\sum_{n \geq 1} a_n$  converge, c'est-à-dire si la suite  $(A_n)_{n \geq 1}$  converge, alors  $Q_f$  est constant égal à  $\sum_{n \geq 0} a_n = \lim A_n$ .

Il résulte de ce qui vient d'être dit que, quand ces conditions (i) à (iv) sont vérifiées, on a

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = R_f = Q_f = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \sum_{n \geq 0} a_n.$$



- 4) Le point essentiel consiste à montrer que les fonctions  $\widehat{\text{Li}}_w$ , pour  $w \in \mathfrak{H}^1$ , appartiennent à  $\mathcal{E}$ . Par linéarité il suffit de considérer le cas où  $w = y_{\underline{s}}$  avec  $\underline{s} = (s_1, \dots, s_k)$ . Commençons par le cas  $k = 1$ .

Si  $s_1 = 1$ , comme on l'a déjà vu, on a  $\text{Li}_1 = \widehat{\text{Li}}_{x_1} = f_1 \in \mathcal{E}$  avec  $P_{\text{Li}_1} = P_{f_1} = \mathcal{P}_{x_1} = 1$ .

Si  $s_1 \geq 2$  on a

$$\text{Li}_{s_1}(x) = \widehat{\text{Li}}_{x_0^{s_1-1} x_1}(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^{s_1}},$$

donc  $\text{Li}_{s_1} \in \mathcal{E}$  avec  $P_{\text{Li}_{s_1}} = \mathcal{P}_{y_{s_1}} = 0$ ,  $Q_{y_{s_1}} = \mathcal{R}_{y_{s_1}} = \zeta(s_1)$ .

Supposons maintenant  $k \geq 2$ . Par récurrence sur  $k$  on suppose  $\text{Li}_{s_2, \dots, s_k} \in \mathcal{E}$  pour tout  $(s_2, \dots, s_k)$ . Pour  $\underline{s} = (s_1, \dots, s_k)$ , notons d'abord

$$a_n^{(\underline{s})} = \frac{1}{n^{s_1}} \sum_{\substack{(n_2, \dots, n_k) \\ n > n_2 > \dots > n_k \geq 1}} \frac{1}{n_2^{s_2} \cdots n_k^{s_k}},$$

de sorte que

$$\text{Li}_{\underline{s}}(x) = \sum_{n \geq 1} a_n^{(\underline{s})} x^n,$$

puis

$$A_n^{(\underline{s})} = \sum_{m=1}^{n-1} a_m^{(\underline{s})}.$$

Examinons déjà le cas  $s_1 = 1$ . On a, pour  $n \geq 1$ ,

$$a_n^{(1, s_2, \dots, s_k)} = \frac{1}{n} A_{n-1}^{(s_2, \dots, s_k)}.$$

On en déduit  $\text{Li}_{1, s_2, \dots, s_k} \in \mathcal{E}$  avec

$$P_{\text{Li}_{1, s_2, \dots, s_k}} = Q_{\text{Li}_{s_2, \dots, s_k}}.$$

Considérons maintenant le cas  $s_1 \geq 2$ . Si on minore chaque  $s_i$  ( $2 \leq i \leq k$ ) par 1, on trouve

$$a_n^{(s_1, \dots, s_k)} = O(n^{-s_1} (\log n)^{k-1}).$$

Cela permet de vérifier  $\text{Li}_{s_1, \dots, s_k} \in \mathcal{E}$  avec

$$P_{\text{Li}_{s_1, \dots, s_k}} = \mathcal{P}_{y_{\underline{s}}} = 0, \quad Q_{y_{\underline{s}}} = \mathcal{R}_{y_{\underline{s}}} = \zeta(\underline{s}).$$

On peut aussi obtenir ce résultat en écrivant

$$a_n^{(s_1, \dots, s_k)} = n^{-s_1} a_n^{(1, s_2, \dots, s_k)} = n^{-s_1} Q_{\text{Li}_{s_2, \dots, s_k}}(\log n) + O((\log n)^{-1-\beta}).$$

a) On vient de voir que si  $s_1 \geq 2$  on a  $\text{Li}_{\underline{s}} \in \mathcal{E}$  et le polynôme  $P_{\text{Li}_{\underline{s}}} = \mathcal{P}_{y_{\underline{s}}}$  associé est nul. Par linéarité on en déduit que le polynôme  $\mathcal{P}_w = P_{\widehat{\text{Li}}_w}$  est nul pour  $w \in \mathfrak{H}^0$ .

Inversement, montrons que si  $\mathcal{P}_w = 0$ , alors  $w \in \mathfrak{H}^0$ .

Tout élément  $w \in \mathfrak{H}^1$  autre que le mot vide s'écrit de manière unique

$$w = x_1^{k-1}x_0w_1 + x_1^{k-2}x_0w_2 + \cdots + x_0w_k$$

avec  $k \geq 1$  et  $w_1, \dots, w_k$  dans  $\mathfrak{H}^1$ . Un tel élément appartient à  $\mathfrak{H}^0$  si et seulement si  $k = 1$ . De plus on a

$$\widehat{\text{Li}}_w(x) \sim c(\log(1-x))^{k-1}$$

quand  $x \rightarrow 1$ , avec une constante  $c \neq 0$ . Donc  $\widehat{\text{Li}}_w(x)$  est borné quand  $x \rightarrow 1$ ,  $0 < x < 1$ , si et seulement si  $k = 1$ . Ainsi la condition  $\mathcal{P}_w = 0$  implique  $w \in \mathfrak{H}^0$  et dans ce cas  $\widehat{\text{Li}}_w(x)$  converge en  $x = 1$  vers  $\widehat{\zeta}(w)$ ,

b) Pour vérifier  $\mathcal{P}_{x_1y_s} = \mathcal{Q}_w$  il suffit par linéarité de le faire quand  $w = y_s$ . Nous avons vu que le coefficient  $a_n^{(1,s)}$  de  $x^n$  dans le développement de Taylor à l'origine de  $\widehat{\text{Li}}_{x_1y_s}$  était relié à la somme  $A_n^{(s)}$  des  $n$  premiers coefficients de Taylor de  $\widehat{\text{Li}}_{y_s} = \text{Li}_s$  par la relation

$$na_n^{(1,s)} = A_{n-1}^{(s)}.$$

On en déduit  $\mathcal{P}_{x_1y_s} = \mathcal{Q}_{y_s}$

c) Pour résoudre la question 2a nous déjà montré que, pour tout  $k \geq 1$ ,  $\deg \mathcal{P}_{x_1^k} = k - 1$  et  $\deg \mathcal{Q}_{x_1^k} = \deg \mathcal{R}_{x_1^k} = k$ .

d) Pour  $w \in \mathfrak{H}^0$  on déduit de la question 3 avec  $f = \widehat{\text{Li}}_w$  que l'on a  $\mathcal{Q}_w = \mathcal{R}_w = \widehat{\zeta}(w)$ .

### Problème III.

- 1) Pour  $\lambda \in K$ , désignons par  $\psi_\lambda$  l'automorphisme de la  $K$ -algèbre  $\mathfrak{H}$  qui envoie  $x_0$  sur  $x_0$  et  $x_1$  sur  $x_1 + \lambda x_0$ . L'application  $\lambda \mapsto \psi_\lambda$  est un homomorphisme du groupe additif de  $K$  dans le groupe des automorphismes de la  $K$ -algèbre  $\mathfrak{H}$ .

On définit un endomorphisme  $K$ -linéaire  $\tilde{\varphi}_\lambda$  de  $\mathfrak{H}^1$  par  $\tilde{\varphi}_\lambda(e) = e$  et

$$\tilde{\varphi}_\lambda(wx_1) = \psi_\lambda(w)x_1$$

pour  $w \in \mathfrak{H}$ . On a

$$\tilde{\varphi}_\lambda(y_s) = \tilde{\varphi}_\lambda(x_0^{s-1}x_1) = \psi_\lambda(x_0^{s-1})x_1 = x_0^{s-1}x_1 = y_s$$

pour  $s \geq 1$  et

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}_\lambda(y_s y_t u) &= \tilde{\varphi}_\lambda(x_0^{s-1}x_1 x_0^{t-1}x_1 u) \\ &= x_0^{s-1}(x_1 + \lambda x_0)x_0^{t-1}\tilde{\varphi}_\lambda(x_1 u) \\ &= x_0^{s-1}x_1 x_0^{t-1}\tilde{\varphi}_\lambda(x_1 u) + \lambda x_0^{s+t-1}\tilde{\varphi}_\lambda(x_1 u) \\ &= x_0^{s-1}x_1\tilde{\varphi}_\lambda(x_0^{t-1}x_1 u) + \lambda\tilde{\varphi}_\lambda(x_0^{s+t-1}x_1 u) \\ &= y_s\tilde{\varphi}_\lambda(y_t u) + \lambda\tilde{\varphi}_\lambda(y_{s+t} u) \end{aligned}$$

pour  $s$  et  $t$  entiers positifs,  $u \in \mathfrak{H}^1$ . Ceci montre que  $\tilde{\varphi}_\lambda$  n'est autre que la restriction de  $\varphi_\lambda$  à  $\mathfrak{H}^1$ .

Pour  $u = wx_1 \in \mathfrak{H}x_1$  on a

$$\varphi_\lambda \circ \varphi_{-\lambda}(u) = \varphi_\lambda \circ \varphi_{-\lambda}(wx_1) = \varphi_\lambda(\psi_{-\lambda}(w)x_1) = (\psi_\lambda \circ \psi_{-\lambda}(w))x_1 = wx_1 = u$$

et

$$\begin{aligned} \varphi_\lambda(y_s \varphi_{-\lambda}(y_t u)) &= \varphi_\lambda(x_0^{s-1} x_1 \varphi_{-\lambda}(x_0^{t-1} x_1 w x_1)) \\ &= \varphi_\lambda(x_0^{s-1} x_1 x_0^{t-1} (x_1 - \lambda x_0) \psi_{-\lambda}(w) x_1) \\ &= x_0^{s-1} (x_1 + \lambda x_0) x_0^{t-1} x_1 w x_1 \\ &= x_0^{s-1} x_1 x_0^{t-1} x_1 w x_1 + \lambda x_0^{s+t-1} x_1 w x_1 \\ &= y_s y_t u + \lambda y_{s+t} u. \end{aligned}$$

Cette relation, que nous venons d'établir pour  $u \in \mathfrak{H}x_1$ , est encore vraie pour  $u = e$ :

$$\varphi_\lambda(y_s \varphi_{-\lambda}(y_t)) = \varphi_\lambda(y_s y_t) = y_s \varphi_\lambda(y_t) + \lambda y_{s+t} = y_s y_t + \lambda y_{s+t}$$

et par linéarité elle s'étend à  $\mathfrak{H}^1 = Ke + \mathfrak{H}x_1$ . Pour  $u \in \mathfrak{H}$  on écrit  $u = wx_0^n$  avec  $w \in \mathfrak{H}^1$  et  $n \geq 0$ ; alors

$$\phi_\lambda(u) = \phi_\lambda(w)x_0^n, \quad \varphi_{-\lambda}(y_t u) = \varphi_{-\lambda}(y_t w)x_0^n$$

et

$$\varphi_\lambda(y_s \varphi_{-\lambda}(y_t u)) = \varphi_\lambda(y_s \varphi_{-\lambda}(y_t w))x_0^n = (y_s y_t w + \lambda y_{s+t} w)x_0^n = y_s y_t u + \lambda y_{s+t} u.$$

Pour  $u \in \mathfrak{H}$  et  $\lambda_1, \lambda_2$  dans  $K$  on a

$$\varphi_{\lambda_1} \circ \varphi_{\lambda_2}(ux_1) = \varphi_{\lambda_1} \circ \psi_{\lambda_2}(u)x_1 = \psi_{\lambda_1 + \lambda_2}(u)x_1 = \varphi_{\lambda_1 + \lambda_2}(ux_1)$$

et enfin, pour  $w \in \mathfrak{H}^1$ ,

$$\varphi_{\lambda_1} \circ \varphi_{\lambda_2}(wx_0^n) = \varphi_{\lambda_1} \circ \varphi_{\lambda_2}(w)x_0^n = \varphi_{\lambda_1 + \lambda_2}(w)x_0^n = \varphi_{\lambda_1 + \lambda_2}(wx_0^n).$$

2) Comme  $\varphi_\lambda(wx_1) = \psi_\lambda(w)x_1$ , on a

$$\varphi_\lambda(y_{\underline{s}}) = x_0^{s_1-1} (x_1 + \lambda x_0) \cdots x_0^{s_{k-1}-1} (x_1 + \lambda x_0) x_0^{s_k-1} x_1$$

pour  $\underline{s} = (s_1, \dots, s_k)$ .

On développe le membre de droite: on obtient une somme de  $2^{k-1}$  termes, correspondant aux choix entre  $x_1$  et  $\lambda x_0$  dans chacun des  $k-1$  facteurs  $(x_1 + \lambda x_0)$ . Le choix  $x_1$  donne  $*$  =, tandis que le choix  $\lambda x_0$  donne  $*$  = +.

3)

a) Montrons, par récurrence sur  $k - \ell \geq 0$ , que l'on a

$$\widehat{\text{Li}}_{y_{s_1} \cdots y_{s_{\ell-1}} \varphi_1(y_{s_\ell} \cdots y_{s_k})}(x) = \sum_{n_1 > n_2 \cdots > n_\ell \geq n_{\ell+1} \geq \cdots \geq n_k \geq 1} \frac{x^{n_1}}{n_1^{s_1} \cdots n_k^{s_k}}.$$

Pour  $k - \ell = 0$  cette relation est claire puisque  $\varphi_1(y_{s_k}) = y_{s_k}$  et  $\widehat{\text{Li}}_{y_{\underline{s}}}(x) = \text{Li}_{\underline{s}}(x)$ .Supposons donc  $k - \ell \geq 1$ . On a

$$\varphi_1(y_{s_\ell} \cdots y_{s_k}) = y_{s_\ell} \varphi_1(y_{s_{\ell+1}} \cdots y_{s_k}) + \varphi_1(y_{s_\ell + s_{\ell+1}} y_{s_{\ell+2}} \cdots y_{s_k}).$$

Cela correspond à la partition de l'ensemble des  $(n_1, \dots, n_k)$  vérifiant

$$n_1 > n_2 \cdots > n_\ell \geq n_{\ell+1} \geq \cdots \geq n_k \geq 1$$

en deux sous-ensembles, le premier avec  $n_\ell > n_{\ell+1}$  et le second avec  $n_\ell = n_{\ell+1}$ . L'hypothèse de récurrence donne

$$\sum_{n_1 > n_2 \cdots > n_\ell > n_{\ell+1} \geq \cdots \geq n_k \geq 1} \frac{x^{n_1}}{n_1^{s_1} \cdots n_k^{s_k}} = \widehat{\text{Li}}_{y_{s_1} \cdots y_{s_\ell} \varphi_1(y_{s_{\ell+1}} \cdots y_{s_k})}(x)$$

et

$$\sum_{n_1 > n_2 \cdots > n_\ell = n_{\ell+1} \geq \cdots \geq n_k \geq 1} \frac{x^{n_1}}{n_1^{s_1} \cdots n_k^{s_k}} = \widehat{\text{Li}}_{y_{s_1} \cdots y_{s_{\ell-1}} \varphi_1(y_{s_\ell + s_{\ell+1}} y_{s_{\ell+2}} \cdots y_{s_k})}(x),$$

ce qui établit la récurrence.

Pour  $\ell = 1$  on en déduit la relation demandée

$$\text{Li}_{\underline{s}}^{(1)}(x) = \sum_{n_1 \geq n_2 \cdots \geq n_k \geq 1} \frac{z^{n_1}}{n_1^{s_1} \cdots n_k^{s_k}}$$

qui, pour  $z = 1$ , donne

$$\zeta^{(1)}(\underline{s}) = \text{Li}_{\underline{s}}^{(1)}(1) = \sum_{n_1 \geq n_2 \cdots \geq n_k \geq 1} \frac{1}{n_1^{s_1} \cdots n_k^{s_k}} \quad \text{si } s_1 \geq 2.$$

b) Les relations

$$\text{Li}_{\underline{s}}^1(x) = \sum_{\underline{\sigma} \in \mathcal{A}(\underline{s})} \text{Li}_{\underline{\sigma}}(x) \quad \text{et} \quad \text{Li}_{\underline{s}}(x) = \sum_{\underline{\sigma} \in \mathcal{A}(\underline{s})} (-1)^{a(\underline{\sigma})} \text{Li}_{\underline{\sigma}}^1(x)$$

pour tout  $\underline{s} = (s_1, \dots, s_k)$ , puis

$$\zeta^{(1)}(\underline{s}) = \sum_{\underline{\sigma} \in \mathcal{A}(\underline{s})} \zeta(\underline{\sigma}) \quad \text{et} \quad \zeta(\underline{s}) = \sum_{\underline{\sigma} \in \mathcal{A}(\underline{s})} (-1)^{a(\underline{\sigma})} \zeta^{(1)}(\underline{\sigma})$$

quand  $s_1 \geq 2$  résultent alors de la question 2).

- 4) Les deux lois et  $\star_\lambda$  sont définies par transport de structure sur  $\mathfrak{H}^1$  des lois de mélange  $\star$  et  $\text{III}$  grâce à l'isomorphisme linéaire  $\varphi_\lambda$ : on a donc

$$\widehat{\text{Li}}_{u\text{III}_\lambda v}^{(\lambda)}(x) = \widehat{\text{Li}}_{\varphi_\lambda(u\text{III}_\lambda v)}(x) = \widehat{\text{Li}}_{\varphi_\lambda(u)\text{III}\varphi_\lambda(v)}(x) = \widehat{\text{Li}}_{\varphi_\lambda(u)}(x) \cdot \widehat{\text{Li}}_{\varphi_\lambda(v)}(x) = \widehat{\text{Li}}_u^{(\lambda)}(x) \cdot \widehat{\text{Li}}_v^{(\lambda)}(x)$$

et

$$\widehat{\zeta}^{(\lambda)}(u \star_\lambda v) = \widehat{\zeta} \circ \varphi_\lambda(u \star_\lambda v) = \widehat{\zeta}(\varphi_\lambda(u) \star \varphi_\lambda(v)) = \widehat{\zeta}(\varphi_\lambda(u)) \widehat{\zeta}(\varphi_\lambda(v)) = \widehat{\zeta}^{(\lambda)}(u) \widehat{\zeta}^{(\lambda)}(v).$$

- 5) Pour  $u$  et  $v$  dans  $\mathfrak{H}^0$ , on a

$$\widehat{\zeta}^{(\lambda)}(u\text{III}_\lambda v) = \widehat{\text{Li}}_{u\text{III}_\lambda v}^{(\lambda)}(1) = \widehat{\text{Li}}_u^{(\lambda)}(1) \cdot \widehat{\text{Li}}_v^{(\lambda)}(1) = \widehat{\zeta}^{(\lambda)}(u) \widehat{\zeta}^{(\lambda)}(v) = \widehat{\zeta}^{(\lambda)}(u \star_\lambda v),$$

donc  $u\text{III}_\lambda v - u \star_\lambda v$  est dans le noyau de  $\widehat{\zeta}^{(\lambda)}$ .

Enfin, pour  $u \in \mathfrak{H}^0$ ,

$$y_1\text{III}_\lambda u = \varphi_{-\lambda}(\varphi_\lambda(y_1)\text{III}\varphi_\lambda(u)) = \varphi_{-\lambda}(y_1\text{III}\varphi_\lambda(u))$$

tandis que

$$y_1 \star_\lambda u = \varphi_{-\lambda}(\varphi_\lambda(y_1) \star \varphi_\lambda(u)) = \varphi_{-\lambda}(y_1 \star \varphi_\lambda(u)).$$

Comme  $\varphi_\lambda(u) \in \mathfrak{H}^0$  on a

$$y_1\text{III}_\lambda u - y_1 \star_\lambda u = \varphi_{-\lambda}(y_1\text{III}\varphi_\lambda(u) - y_1 \star \varphi_\lambda(u)) \in \varphi_{-\lambda}(\ker \widehat{\zeta}) = \ker \widehat{\zeta}^{(\lambda)}.$$

## Remarques

- 1) On peut écrire  $\text{Li}_{\underline{s}}^{(\lambda)}(x)$  comme une intégrale itérée de Chen

$$\text{Li}_{\underline{s}}^{(\lambda)}(x) = \int_0^x \omega_0^{s_1-1} \omega_\lambda \cdots \omega_0^{s_{k-1}-1} \omega_\lambda \omega_0^{s_k-1} \omega_1$$

avec

$$\omega_0 = \frac{dx}{x}, \quad \omega_1 = \frac{dx}{1-x}, \quad \omega_\lambda = \omega_1 + \lambda \omega_0 = \frac{\lambda + (1-\lambda)x}{x(1-x)} \cdot dx.$$

La loi de mélange  $\text{III}_\lambda$  reflète les équations différentielles satisfaites par les fonction  $\text{Li}_{\underline{s}}^{(\lambda)}(x)$ , qui sont

$$\frac{d}{dx} \text{Li}_{\underline{s}}^{(\lambda)}(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \text{Li}_{s_1-1, s_2, \dots, s_k}^{(\lambda)}(x) & \text{si } s_1 \geq 2, \\ \left( \frac{1}{1-x} + \frac{\lambda}{x} \right) \text{Li}_{s_2, \dots, s_k}^{(\lambda)}(x) & \text{si } s_1 = 1 \text{ et } k \geq 2, \\ \frac{1}{1-x} & \text{si } s_1 = 1 \text{ et } k = 1. \end{cases}$$

2) Pour  $\lambda = 0$ , la loi  $\star_0$  coïncide avec la loi harmonique  $\star$  de Hoffmann, puisque  $\varphi_0$  est l'identité.

Pour  $s$  et  $t$  entiers positifs on a

$$y_s \star_\lambda y_t = y_s y_t + y_t y_s + (1 - 2\lambda) y_{s+t}.$$

La relation

$$y_s u \star_\lambda y_t v = y_s (u \star_\lambda y_t v) + y_t (y_s u \star_\lambda v) + (1 - 2\lambda) y_{s+t} (u \star_\lambda v)$$

est donc vraie pour  $\lambda = 0$ ,  $u$  et  $v$  dans  $\mathfrak{J}^1$ , et elle est encore vraie quand  $\lambda \in K$ ,  $u = v = e$ , mais elle n'est pas vraie par exemple quand  $\lambda \neq 0$ ,  $u = e$  et  $v = y_r$ .