

Feuille 10
Calcul différentiel

Exercice 1 — Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 .

1. Soit $g : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x, y) = f\left(xye^{(x^2-y^2)}\right)$. Montrer que la fonction g est de classe C^1 et calculer les dérivées partielles de g au moyen de f' .
2. Soit $h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par $h(x, y) = \left(x + f(xy), \frac{y}{1+x^2}\right)$. Montrer que la fonction h est de classe C^1 et calculer la matrice jacobienne de h en tout point de \mathbb{R}^2 .

Exercice 2 — Soit $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 .

1. Soit $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $\varphi(t) = f(t^2, t^4, e^t)$. Montrer que φ est dérivable. Pour tout nombre réel t , exprimer $\varphi'(t)$ au moyen des dérivées partielles de f .
2. Soit $g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x, y) = f(x \sin(y), xy^2, x + y^2)$. Montrer que g est de classe C^1 et calculer les dérivées partielles de g .

Exercice 3 — Soit $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y, z) = x^3y + \cos(xz)$. Soit $g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x, y) = f(x^2 + y^2, xy, x - y)$. Montrer que la fonction g est de classe C^1 et calculer les dérivées partielles de g .

Exercice 4 — Soit $f : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y, z) = x^{y^z}$.

1. Montrer que la fonction f est de classe C^1 et calculer les dérivées partielles de f .
2. Soit $g :]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x) = x^{x^x}$. Montrer que g est dérivable et calculer $g'(x)$ pour tout $x > 0$.

Exercice 5 — Le but de cet exercice est de chercher les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 telles que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0. \quad (*)$$

1. Soient g et h deux fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R} de classe C^2 . Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = g(x) + h(y)$. Montrer que f est de classe C^2 et que f est solution de (*).
2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 qui vérifie (*).

(a) Montrer qu'il existe une fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \varphi(y) \quad \text{pour tout } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(b) Montrer qu'il existe des fonctions $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 telles que $f(x, y) = g(x) + h(y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Exercice 6 — Considérons l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - (x + 1)e^x \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0. \quad (*)$$

1. Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 . Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = h(y + xe^x)$. Montrer que f est de classe C^1 et que f est solution de (*).
2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 qui vérifie (*). Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $h(t) = f(0, t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.
 - (a) Montrer que la fonction h est de classe C^1 .
 - (b) Soit $t \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $h(t) = f(x, t - xe^x)$.
 - (c) En déduire que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) = h(y + xe^x)$.
3. Donner toutes les solutions de (*).

Exercice 7 — Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est de classe C^1 .
2. Montrer que les dérivées partielles secondes

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$$

existent. Les calculer.

3. La fonction f est-elle de classe C^2 ?

Exercice 8 — Soit $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 et soit $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = u(\sqrt{x^2 + y^2})$. Montrer que la fonction f est de classe C^2 et que pour tout $(x, y) \neq (0, 0)$ on a l'égalité :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = u''(r) + \frac{1}{r}u'(r) \quad \text{où } r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Exercice 9 — Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = y^2 - x^3 + 3x$.

1. Calculer les dérivées partielles de f et trouver les points critiques de f .
2. Soit (x_0, y_0) un point de \mathbb{R}^2 qui n'est pas un point critique de f . Posons $a = f(x_0, y_0)$. Soit L la ligne de niveau a de f . Ecrire l'équation de la tangente à L au point (x_0, y_0) .
3. Soit a un nombre réel.
 - (a) Etudier la fonction $x \mapsto x^3 - 3x + a$.
 - (b) Dessiner les différentes allures de la ligne de niveau a de la fonction f .

Exercice 10 — Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$. Pour tout nombre réel a , notons L_a la ligne de niveau a de la fonction f .

1. Trouver les points critiques de f .
2. Soit a un nombre réel. Supposons que L_a n'est pas vide et que $a \neq 0$ et $a \neq -8$. Montrer que la courbe L_a a une tangente en tout point.
3. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $f(x, y) + 8 = (x^2 - 2)^2 + (y^2 - 2)^2 + 2(x + y)^2$.
4. En déduire que la fonction f admet un minimum m et préciser les points (x, y) en lesquels ce minimum est atteint.
5. Montrer que les lignes de niveau de f sont des parties compactes de \mathbb{R}^2 .

Exercice 11 — Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = xy(x^2 + y^2 + xy - 1)$.

1. Que valent $f(y, x)$ et $f(-x, -y)$? Que peut-on en déduire sur les points critiques de f ?
2. Déterminer les points critiques de f .
3. Déterminer les extrema locaux de f .
4. La fonction f est-elle majorée? Est-elle minorée?

Exercice 12 — Etudier les extrema locaux des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes :

$$\begin{array}{ll}
 (a) f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy & (b) f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y \\
 (c) f(x, y) = (4x - 3y)e^{-(x^2+y^2)} & (d) f(x, y) = (x - y)e^{xy}.
 \end{array}$$

Exercice 13 — Soit S la surface d'équation $z = x - 2(x^2 + y^2)^2$, c'est-à-dire soit

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x - 2(x^2 + y^2)^2\}.$$

1. Soit $(a, b, c) \in S$. Ecrire l'équation du plan tangent à S au point (a, b, c) . En quels points le plan tangent à S est-il horizontal?
2. Montrer qu'au point $(0, 0, 0)$, la surface est en dessous de son plan tangent.

Exercice 14 — Soit S la surface d'équation $z = (1 + x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2$, c'est-à-dire soit

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = (1 + x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2\}.$$

1. En quels points le plan tangent à S est-il horizontal ?
2. En chacun de ces points, quelle est la position de S par rapport à son plan tangent ?

Exercice 15 — Etudier les extrema locaux des fonctions $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes :

(a) $f(x, y, z) = z^2(1 + xy) + xy$ (b) $f(x, y, z) = (x + y)e^{x+y-z^2}$.